

Instellen van een Duodopa® pomp middels thuisbehandeling

Uw zorgverlener heeft met u de behandeling van Duodopa® pomp besproken. Graag leggen we in deze folder uit wat er in de eerste week met een Duodopa® pomp gebeurt.

Wie zijn er betrokken bij de start van de behandeling?

Behandelteam Duodopa®:

- uw behandelend parkinsonneuroloog
- uw parkinsonverpleegkundige
- Duodopa® – verpleegkundige
- MDL verpleegkundige

Dagelijkse medische en verpleegkundige zorg wordt verleend door:

- thuiszorgmedewerkers
- Duodopa® – verpleegkundige

Plaatsing en nazorg neusmaagsonde en PEG-J sonde:

- MDL-arts
- MDL – verpleegkundige

Voor dat de behandeling start

Voordat u start met de behandeling heeft u een intakegesprek met de MDL-verpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de plaatsing van de neusmaagsonde en de PEG-J sonde.

Een verpleegkundige vanuit Duodopa® komt bij u thuis langs voor een intakegesprek. Deze verpleegkundige komt ook bij u langs in de eerste week van de behandeling.

Als deze verpleegkundige er niet is, zorgt de thuiszorgmedewerker voor de plaatsing van de neusmaagsonde, de verzorging en de aansluiting van de Duodopa® pomp.

Let op: het is dus belangrijk dat de thuiszorg is geregeld.

In eerste instantie gaat het om een proefperiode van een week met Duodopa® via een neusmaagsonde. Als deze periode succesvol is, volgt definitieve plaatsing van een PEG-J sonde.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Het aansluiten van de Duodopa® pomp

Het plaatsen van de neusmaagsonde doen we op de polikliniek in het ziekenhuis. De verpleegkundige vanuit Duodopa® is hierbij ook aanwezig, waardoor de Duodopa® pomp gelijk wordt aangesloten.

Vorbereiding

U komt nuchter naar het ziekenhuis. U eet dus **geen** ontbijt. Wel mag u een kopje water of thee drinken. U krijgt alleen uw parkinsonmedicatie die u met water mag innemen. Deze neemt u zelf vanuit huis mee. U krijgt een roesje, zodat de ingreep makkelijker en pijnloos kan verlopen. Het is mogelijk dat u de rest van de dag wat slaperig bent. Als alles goed verlopen is, kunt u dezelfde dag weer naar huis.

Thuis met de Duodopa® pomp

De eerste dag thuis

De Duodopa® pomp wordt rond 22.00 – 23.00 uur afgesloten door de thuiszorg. Wanneer u thuis de langwerkende medicatie Levodopa in tabletvorm innam voor het slapen, krijgt u deze ook tijdens de behandeling met de Duodopa® pomp.

De tweede dag

De verpleegkundige van de Duodopa® pomp heeft de eerste dagen contact met u om te kijken hoe u reageert op de Duodopa®, of er bijwerkingen zijn en om eventueel extra oefenen om zelf de pomp te bedienen. Meerdere keren per dag worden er neurologische testen gedaan door de Duodopa® verpleegkundige om de dosering van de Duodopa® zo goed mogelijk in te stellen.

Plaatsing PEG-J sonde

Als u een goede reactie hebt op de Duodopa® pomp wordt na een week de proefperiode met de neusmaagsonde afgerond en de definitieve sonde, de PEG-J sonde, geplaatst.

U komt nuchter naar het ziekenhuis. Het plaatsen wordt ook weer onder een roesje gedaan op de polikliniek. U kunt zich de rest van de dag weer wat slaperig voelen.

De verpleegkundige van Duodopa® is hierbij aanwezig. Als alles goed is verlopen is, kunt u dezelfde dag weer naar huis.

Vervolg na de titratie

De thuiszorg komt in de ochtend de Duodopa® pomp aansluiten en in de avond weer afsluiten. De thuiszorg verzorgt en controleert ook de insteekopening van de PEG-sonde. Zodra de insteekopening is genezen, kan de thuiszorg hiervoor gestopt worden. Mocht het niet lukken om zelf de pomp aan- of af te koppelen dan blijft de thuiszorg u hiermee helpen.

Twee weken na het plaatsen van de PEG-J sonde komt u ter controle bij de parkinsonverpleegkundige op de polikliniek. We evalueren dan het effect van de Duodopa® pomp en bespreken hoe het instellen van de pomp verlopen is. Als het nodig is stellen we de dosering van de Duodopa® pomp verder bij.

Na 4-6 weken heeft u een afspraak ter controle bij uw parkinsonneuroloog. Samen bespreekt u het effect van de pomp en wordt er gekeken of er nog aanpassingen nodig zijn. De verpleegkundige van Duodopa® belt u een week na start op om te evalueren hoe het met de pomp gaat. Na 2 maanden komt ze bij u op huisbezoek. Ook krijgt u na 4 weken nog een afspraak voor controle op de polikliniek MDL bij de MDL-verpleegkundige.

Heeft u vragen?

Zijn er vragen dan kunt u daarvoor terecht bij uw parkinsonverpleegkundige.

Telefoon nummer: 040 888 8410 of per e-mail: parkinsonverpleegkundige@mmc.nl