

Cholescintigrafie met morfineprovocatie

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat binnenkort een Cholescintigrafie met morfineprovocatie (galwegenscan) wordt gemaakt. In deze folder informeren wij u over dit onderzoek.

Het onderzoek gebeurt vaak op 2 verschillende tijdstippen. Het tijdstip voor de 2^e serie foto's wordt met u na de 1^{ste} sessie afgesproken.
Het kan zijn dat het in uw situatie anders is.

Uw afspraak vindt plaats op locatie Veldhoven.

Zwangerschap/Borstvoeding

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding, meldt dit dan aan de afdeling nucleaire geneeskunde.

Cholescintigrafie met morfineprovocatie

Een cholescintigrafie met morfineprovocatie is een onderzoek, waarbij afwijkingen aan de galwegen kunnen worden vastgesteld. U krijgt daarom een hoeveelheid radioactieve stof (99mTechnetium) toegediend in een bloedvat. Aansluitend worden er foto's gemaakt. Indien nodig wordt door de nucleair geneeskundige besloten om een dosis morfine toe te dienen.

De voorbereiding

Voor dit onderzoek dient u vanaf 00.00 uur nuchter te zijn. Dit betekent dat u niet mag eten en drinken. U kunt wel uw medicijnen innemen met wat water. Gebruikt u morfine, dan stopt u hiermee ook vanaf 00.00 uur.

Het onderzoek

Op de afdeling krijgt u het radioactieve technetium Bridatec toegediend via een tevoren ingebracht infuus in uw arm. Behalve de prik voelt u niets. U krijgt het niet extra warm en u wordt er niet misselijk of akelig van. Na de injectie van de radioactieve stof wordt direct gestart met het maken van foto's. Het maken van de foto's duurt 1,5 uur. Na ongeveer een half uur kan besloten worden om een dosis morfine toe te dienen. De mogelijke bijwerkingen van de morfine worden door de nucleair geneeskundige met u besproken.

Voor, tijdens en na het onderzoek wordt bij u bloed afgenomen via het ingebrachte infuus. Tijdens het maken van de foto's mag u uw kleding aanhouden. Er mogen geen metalen voorwerpen zoals sleutels en/ of kleingeld in zitten.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Met de gammacamera worden opnamen gemaakt van de buik. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

De duur van het onderzoek

Het eerste deel van het onderzoek duurt in totaal ongeveer 2 uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u niet zelfstandig naar huis. De rijvaardigheid kan beïnvloed zijn door het gebruik van morfine. U kunt gewoon eten en drinken en u mag alle medicijnen weer gebruiken. Uw behandelend specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek bij het volgende bezoek aan de polikliniek.

De mogelijke risico's en complicaties

Radioactiviteit is een natuurlijk verschijnsel dat altijd en overal aanwezig is. Het komt van nature in kleine hoeveelheden voor in de bodem, de lucht, ons voedsel, de muren en zelfs in uw eigen lichaam. De extra straling die u ontvangt bij dit onderzoek is gering en vormt geen gevaar voor uw omgeving. Mogelijke bijwerkingen van morfine zullen met u worden besproken.

Belangrijk

- Neem bij verhindering zo snel mogelijk contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde, telefoonnummer (040) 888 90 10.
- Heeft u nog vragen bel dan tijdens kantooruren met de afdeling nucleaire geneeskunde, telefoonnummer (040) 888 90 10.
- U kunt uw vragen ook stellen vlak voor, tijdens en na het onderzoek.
- Vragen over de uitslag stelt u aan uw behandelend specialist.