

Opname voor een Apomorfine pomp

Inleiding

U wordt opgenomen voor het instellen op een Apomorfine pomp.
In deze folder wordt het globale beloop van deze opname beschreven.

Wie zijn betrokken bij deze opname?

Behandelteam Apomorfine:

- Uw behandelend Parkinsonneuroloog;
- Uw Parkinsonverpleegkundige;
- Apomorfine-verpleegkundige.

Dagelijkse medische en verpleegkundige zorg wordt verleend door:

- De zaalarts;
- Algemeen verpleegkundige neurologie.

Wat gebeurt er tijdens de opname?

Dag 1

U neemt uw ochtendmedicatie niet of gedeeltelijk in. De parkinsonverpleegkundige bespreekt dat voorafgaand aan de opname met u.

- Op maandagochtend om 9.00 meldt u zich op de afdeling Neurologie. U neemt uw medicatie mee naar het ziekenhuis.
- Eerst testen we hoe u reageert op de medicijnen: krijgt u bijwerkingen en hoe reageren uw parkinsonsymptomen op de medicijnen? Dit doen we door iedere 30-60 minuten met een kleine prikpen medicijnen (apomorfine) onder de buikhuid te injecteren. We houden het effect op de parkinsonsymptomen, uw bloeddruk en eventuele bijwerkingen in de gaten.
- Is er voldoende effect en verdraagt u de apomorfine zonder te veel bijwerkingen, dan wordt een kleine onderhuidse infuusnaald in uw buik geprikt. Dit naaldje is gekoppeld aan het pompsysteem van de apomorfine. De apomorfine wordt vervolgens stapsgewijs opgehoogd naast uw bestaande parkinsonmedicijnen. Afhankelijk van het effect van de apomorfine worden in de dagen hierna uw eigen parkinsonmedicijnen(ten dele) afgebouwd.

Hoe tevreden bent u over uw specialist of ziekenhuis? Geef uw mening op [ZorgkaartNederland.nl](https://www.zorgkaartnederland.nl)

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

In de loop van de dag komen de parkinsonverpleegkundige en/of zaalarts bij u langs op de afdeling. U ziet uw behandelend neuroloog niet tijdens de opname. Wel is er nauw overleg tussen de parkinsonverpleegkundige, zaalarts en de parkinsonneuroloog over u en het instellen van de apomorfine pomp.

- De apomorfine pomp wordt rond 22:00 - 23:00 uur afgesloten. Wanneer u thuis langwerkende levodopa in tabletvorm innam voor het slapen, krijgt u deze ook tijdens de behandeling met de apomorfine pomp.

In sommige gevallen wordt er door de neuroloog voor gekozen om niet eerst een testfase te doen, maar meteen het pompsysteem van de apomorfine aan te sluiten en langzaam de dosering in de loop van een paar dagen op te hogen. Dit is ook een veilige methode. De keuze wordt reeds voorafgaand aan de opname door de parkinsonneuroloog gemaakt.

Dag 2 - 4

- De apomorfine pomp wordt in de ochtend na het wakker worden aangesloten. Ongeveer 30 minuten nadat deze is aangesloten, mag u zich wassen en aankleden, zo nodig met ondersteuning van de verzorgende / verpleegkundige.
- De parkinson verpleegkundige zal enkele keren per dag kleine neurologische testen met u doen om de dosering van de apomorfine zo goed mogelijk in te stellen.
- De apomorfine pomp wordt rond 22:00 - 23:00 uur afgesloten. Wanneer u thuis langwerkende levodopa in tabletvorm innam, krijgt u deze ook tijdens de behandeling met de apomorfine pomp. In sommige gevallen wordt gekozen om de apomorfine ook gedurende de nacht toe te dienen.

Dag 5

De dag is zoals de voorgaande dagen.

Het behandelteam overlegt met elkaar en bespreekt het effect van de apomorfine pomp. Op basis daarvan wordt besloten wanneer u ontslagen kan worden uit het ziekenhuis. De parkinsonverpleegkundige bespreekt dit met u.

Duur opname

De duur van de opname is afhankelijk van hoe snel we een goede dosering van de apomorfine voor u hebben gevonden met (gedeeltelijke) afbouw van de levodopa.

Na de opname

De thuiszorg komt in de ochtend de apomorfine pomp aansluiten en in de avond weer afsluiten. Bij wens kan u of uw partner hierin geschoold worden. Dit vindt dan al tijdens de opname plaats. De parkinsonverpleegkundige bespreekt deze optie met u.

De apomorfineverpleegkundige belt u na een week op om te evalueren hoe het thuis gaat met de pomp. Na 2 maanden komt ze bij u op huisbezoek.

Twee weken na de opname komt u ter controle bij de parkinsonverpleegkundige op de polikliniek. We evalueren dan het effect van de apomorfine pomp en bespreken hoe de opname voor u is geweest. Als het nodig is stellen we de dosering van de apomorfine pomp verder bij.

Na 4 weken komt u ter controle bij uw parkinsonneuroloog.