

## Salbutamol zo nodig inhalatieschema

Salbutamol = Airomir en Ventolin

### Dosering:

Salbutamol 100 microgram, 2 pufjes per keer

### Start Salbutamol

Starten met Salbutamol zodra de eerste verschijnselen/klachten optreden van:

- Hoesten;
- Kortademigheid/ benauwdheid;
- Piepen (bij de uitademing).

### Let op:

- Geef elke puf apart. Dat wil zeggen: één pufje per keer in de voorzetkamer.
- Altijd geldt dat u ervan overtuigd moet zijn dat er op een correcte manier is geïnhaleerd.
- Een duidelijke afname van de klachten betekent dat uw kind bij de volgende toediening van de medicatie eigenlijk nog klachtenvrij is.

### Werking

Salbutamol werkt binnen 10 à 15 minuten. Mocht een pufje niet goed zijn gegaan, kunt u deze puf gerust nogmaals herhalen.

Salbutamol werkt ongeveer 3 uur. Merkt u dat uw kind na 3 uur opnieuw toenemende klachten heeft, geef dan weer Salbutamol (2 pufjes).

### Toediening

Salbutamol mag als het nodig is elke 3 uur gegeven worden, 2 tot 4 pufjes per keer.

Als uw kind de Salbutamol elke 3 uur nodig heeft, is het belangrijk hier minimaal 24 uur mee door te gaan (eventueel 48 uur).

Dit betekent dat u ook 's nachts moet doorgaan met het geven van de Salbutamol elke 3 uur. Uw kind krijgt dan dus 8 x daags 2 pufjes.

*De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.*

**Waarschuwen huisarts/kinderarts:**

In eerste instantie neemt u contact op met de huisarts:

- Als er geen verbetering of zelfs een toename van de klachten is ondanks het geven van de salbutamol.
- Als u 48 uur Salbutamol à 3 uur aan het geven bent en u van mening bent dat u nog niet kunt gaan afbouwen met de Salbutamol.
- Als de Salbutamol minder dan 1 uur werkt of gaat minder dan 1 uur werken.
- Als uw kind koorts krijgt (temperatuur van 39.0-39.5 graden), pijn bij het hoesten/ademhalen en u bemerkt geen of weinig werking van Salbutamol.

**Afbouwschema**

Bemerkt u een duidelijke afname van de klachten dan kunt u de Salbutamol weer gaan afbouwen. Het afbouwen van Salbutamol gebeurt op geleide van de klachten van uw kind en wel als volgt:

**Van 8 x daags naar 6 x daags 2 pufjes:**

2 pufjes Salbutamol inhaleren à 4 uur gedurende 24 uur (zowel dag en nacht).

**Na 24 uur: van 6 x daags naar 4 x daags 2 pufjes:**

Bij duidelijke afname van klachten doorgaan met 2 pufjes Salbutamol inhaleren per keer overdag op de volgende tijdstippen: 8.00 - 13.00 - 18.00 - 23.00 uur.

Zo nodig 's nachts eenmalig 2 pufjes Salbutamol erbij geven.

**Zo nodig: 1 tot 2 pufjes per dag:**

Bij duidelijke afname van klachten 1 à 2 pufjes Salbutamol zo nodig per dag.