

Sedatie op de spoedeisende hulp

U krijgt op de afdeling spoedeisende hulp een kortdurende medische ingreep die zonder goede verdoving pijnlijk kan zijn. De arts heeft met u besproken dat u naast pijnmedicatie ook medicijnen krijgt om u slaperig te maken. We noemen dit sedatie. Sedatie is het verlagen van uw bewustzijn. Met behulp van sedatie kan u zich beter ontspannen waardoor de ingreep beter uitgevoerd kan worden.

Hoe werkt het?

Door een combinatie van sedatie en pijnstilling kan de arts de ingreep goed uitvoeren op een voor u zo comfortabel mogelijke manier.

Pijnstilling kunnen we op verschillende manieren toedienen, bijvoorbeeld door een infuus, met een tablet of door een injectie ter plaatse van de pijn. U krijgt de slaapverwekkende medicijnen meestal via een infuus in uw onderarm. Zo werken de medicijnen heel snel. Het infuus wordt na de ingreep weer verwijderd. Ook kunnen we sommige medicijnen via de neus of via een masker toedienen.

Na het toedienen van de slaapmiddelen is uw bewustzijn verminderd. Het kan zijn dat u in een diepe slaap terecht komt. Daarom controleren we uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte. U krijgt hiervoor een aantal plakkers op uw borst, deze worden aangesloten op een monitor. Als dat nodig is, kunnen we extra zuurstof toedienen.

Naar huis

Na de behandeling mag u weer naar huis, mits:

- u weer goed wakker bent;
- uw hartslag en bloeddruk goed zijn;
- u kunt drinken en niet misselijk bent;
- u rechtop kan zitten en niet erg duizelig bent.

Als dat nodig is, krijgt u pijnstillers mee naar huis.

Wij raden u aan om vandaag zelf geen alcohol te drinken, geen belangrijke beslissingen te nemen en geen voertuigen of machines te besturen, dit kan gevaarlijk zijn. Voor kinderen geldt; laat ze vandaag niet onbeheerd alleen spelen of met speelgoed of toestellen waar ze vanaf kunnen vallen.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Een arts waarschuwen

Als u binnen 24 uur na de behandeling last krijgt van onderstaande klachten, belt u dan naar de afdeling spoedeisende hulp:

- misselijkheid en/of braken;
- andere klachten die u niet vertrouwt.

De afdeling SEH is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: (040) 888 88 11.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze kaart nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen.