

Ontslagadviezen na een Angiografie – Seldinger en Dotter onderzoek van de bloedvaten

- Pleister na 1 dag verwijderen. Eventueel een nieuwe pleister aanbrengen, totdat de huid genezen is.
- De huid schoonmaken met water en milde zeep en voorzichtig afdrogen.
- Na 1 dag mag u weer douchen.
- Niet baden of zwemmen gedurende 7 dagen.
- U kan een kleine zwelling en/of lichte gevoeligheid in de lies hebben; dit is normaal.
- Op de plaats van de punctie kan een bloeding ontstaan. Deze zakt in de loop van de tijd uit.
- De eerste 24 uur niet autorijden.
- De eerste 4 dagen: niet persen, niet zwaarder tillen dan 5 kg, niet sporten, niet fietsen.
- Wanneer u tijdens de ingreep een angio seal (= plugje, waarmee het bloedvat wordt gesloten) hebt gekregen, dan moet u de eerste 3 maanden het bijbehorende zakkaartje bij u dragen.
- Wees alert op oedemen (vochtophoping) in de benen. Leg uw benen zo nodig omhoog als u zit, maar zorg ook dat u voldoende mobiliseert.

In de volgende gevallen dient u contact op te nemen met de behandelende arts:

- Bij hevig toenemende pijnklachten, die niet verminderen na het innemen van pijnstillers
- Bij een forse bult ter hoogte van aanprikplaats (meestal de lies)
- Bij tekenen van infectie, zoals roodheid
- Bij koud en of gevoelloos worden van het been

Vragen?

- **Op de dag van opname** kunt u tot 19.00 uur contact opnemen met de Dagbehandeling: (040) 888 9280.
- **Tussen 19.00 en 08.30 uur** kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp: (040) 888 8811.
- **Na de dag van opname** kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de Polikliniek Chirurgie: (040) 888 85 50.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.