

Arterie temporalis biopsie

Biopsie van de slagader bij de slaap

U bent naar de chirurg verwezen voor een biopt van de slagader ter hoogte van uw slaap. De biopt kan uitwijzen of de slagader ontstoken is.

Wat houdt een biopsie in?

Bij een biopsie wordt een klein stukje weefsel weggenomen. Dit noemen we een biopt. Dit betekent dat de chirurg een klein stukje weefsel uit het bloedvat bij uw slaap weghaalt voor verder onderzoek. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Als het stukje weefsel de typische kenmerken heeft van een bloedvatontsteking, dan is de diagnose definitief: arteritis temporalis. Soms is de ontsteking niet te zien in de biopsie. Toch kunt u dan een ontsteking hebben omdat de ontsteking net niet in het stukje weefsel zat dat is weggenomen.

Wat kunt u verwachten?

Voor de biopsie hoeft u niet te worden opgenomen. Na de ingreep kunt u weer naar huis. Het is prettig als er iemand met u meekomt die u thuis kan brengen. Hij/zij kan op u wachten in de wachtruimte.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

U mag gewoon eten en drinken voordat u naar het ziekenhuis komt. Tijdens de ingreep mag u geen sieraden dragen. U kunt ringen, kettingen, armbanden en horloges het best thuis laten. Wij vragen u geen bodylotion, crème of make-up te gebruiken op de plaats waar de ingreep uitgevoerd zal worden.

Als u bloedverdunners gebruikt, moet u hier misschien van te voren mee stoppen. Uw chirurg zal dit met u bespreken.

Hoe verloopt de behandeling?

U wordt door een verpleegkundige naar een behandelkamer gebracht. Daarna mag u gaan liggen op de behandeltafel. Aan de kant van het biopt zal eerst naar pulsaties (kloppingen) van het bloedvat worden gevoeld. Daarnaast kan met een echoapparaat naar de doorstroming van het bloedvat worden gezocht.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

De chirurg of arts-assistent verdooft het gebied waar de ingreep plaatsvindt. Daarna wordt het goed schoongemaakt en bedekt met een doek. De prikken voor de verdoving zijn even pijnlijk, maar daarna voelt u geen pijn meer. U merkt wel dat u behandeld wordt. Het bloedvat wordt opgezocht en er wordt een stukje weefsel tussenuit gehaald. De wond wordt weer gesloten met een hechting die vanzelf oplost, u hoeft hiervoor niet terug te komen op de polikliniek Chirurgie.

De uitslag krijgt u van uw reumatoloog of internist (uw arts die de biopsie bij de chirurg heeft aangevraagd). De biopsie duurt ongeveer 30 minuten.

Kunnen er complicaties optreden?

Zoals bij iedere ingreep kunnen complicaties optreden. Deze komen niet vaak voor en kunnen meestal behandeld of verholpen worden.

- Er kan een kleine bloeding ontstaan en soms kan er een doof gevoel optreden rondom de wond of de oorlel.
- Andere complicaties zijn een nabloeding of wondinfectie.
- Ook is er een heel kleine kans dat de zenuw die zorgt voor aansturing van de spieren in het gezicht wordt geraakt. Beschadiging van deze zenuw kan leiden tot een tijdelijk of blijvend hangend ooglid.

Natuurlijk nemen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om complicaties te voorkomen.

Heb ik na de biopsie pijn?

Ongeveer één tot twee uur na de ingreep is de verdoving uitgewerkt. Het is mogelijk dat u last krijgt van napijn. Als u hier veel last van heeft, kunt u een pijnstiller nemen. U kunt het beste kiezen voor paracetamol. Wij raden u aan om deze pijnstillers voor de ingreep alvast in huis te hebben.

Wat mag ik wel en wat niet na de biopsie?

Na de ingreep wordt u duidelijk verteld wat u thuis wel en niet mag doen.

- Omdat u zich na de plaatselijke verdoving wat duizelig kunt voelen, kunt u beter niet zelf met de auto naar huis rijden (ook om verzekeringstechnische redenen raden wij u dit af).
- Na 24 uur mag u zich gewoon weer douchen.
- Als de wond na 48 uur droog is, hoeft er geen nieuwe pleister meer op. Als de wond gaat bloeden, kunt u het beste met een schone doek 10 minuten op de wond drukken.
- Na de poliklinische ingreep hoort u wat de eventuele vervolgspraken zijn.

Contact

Heeft u voorafgaande aan de ingreep of na afloop nog vragen of problemen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie.