

Maculapucker

Iedereen met een maculapucker ondervindt, als het goede oog dicht is, enige vorm van vervorming/vertekening van het beeld. Dit heet metamorfopsie. Dit is geen directe reden om een operatie te verrichten. In de meeste gevallen verergeren de klachten langzaam, maar de ziekte kan ook jaren stabiel blijven.

Een glasvochtoperatie (vitrectomie) voor een maculapucker kan niet alle klachten oplossen. Ook kan het de gezichtsscherpte in de regel niet volledig herstellen. Daarom opereren we niet elke patiënt. Bij patiënten waarbij een afname van de gezichtsscherpte is waargenomen of verwacht wordt, kan een glasvochtoperatie zinvol zijn om de gezichtsscherpte te behouden. Voor sommige patiënten belemmert een pucker het kijken met beide ogen. Deze patiënten geven ook vaak aan dat ze het oog met de pucker sluiten als ze iets scherp willen zien. Bij deze patiënten kan een glasvochtoperatie zinvol zijn, zodat deze klachten verminderd kunnen worden.

Operatie

De meeste patiënten worden onder plaatselijke verdoving aan een pucker geopereerd. De operatie duurt over het algemeen 20-30 minuten. Na de operatie wordt het oog gevuld met vocht. Een enkele keer lekken de wondjes en wordt er een kleine luchtbel achtergelaten. Dat ziet u in de dagen erna als een ronde schijf onder in u beeld. Deze luchtbel verdwijnt vanzelf na 2 tot 10 dagen.

Staar

Als u al aan staar bent geopereerd, zal de glasvochtoperatie de sterkte iets meer min maken. Over het algemeen is het niet noodzakelijk de bril hiervoor na de operatie aan te passen. Als u nog niet geopereerd bent aan staar en u ouder bent dan 40 jaar, zal er snel na de operatie staar ontstaan. Daarom combineren we de operatie in dat geval met een staaroperatie. In de regel wordt bij deze gecombineerde operatie een standaard lens geplaatst.

Vanwege het netvliesprobleem waarvoor u geholpen wordt, is het plaatsen van een multifocale lens niet mogelijk. Indien er een significante cilinderafwijking is op de lensmeting, kan het soms wel zinvol zijn om dit te corrigeren met een speciale cilinder-implantlens. Houd er dan wel rekening mee dat een cilinder-implantlens niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. In dat geval zijn er voor u kosten aan verbonden. Om te kijken of dat mogelijk is, wordt er voor een cilinder-implantlens vooraf aanvullend onderzoek gedaan. Hiervoor is een aparte afspraak noodzakelijk.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Beloop en herstel

Het herstel na deze operatie is traag. Het snelste herstel vindt de eerste drie maanden na de operatie plaats. Daarna kan langzaam verder herstel optreden tot 1-2 jaar na de operatie. De gezichtsscherpte (visus) verbetert in de regel, maar tot welk niveau de gezichtsscherpte verbetert, valt niet vooraf te voorspellen. De beeldvervorming wordt minder maar verdwijnt in de regel niet. Hierbij geldt: hoe beter de gezichtsscherpte, hoe meer storend de beeldvervorming kan zijn. Lezen zal altijd lastiger zijn dan veraf kijken met het betreffende oog.

Na de operatie moet u 3 weken uw ogen druppelen. Daarna is het mogelijk dat er, door de druppels en de operatie, een periode zandgevoel en irritatie aanwezig zijn. Hiervoor kunnen kunsttranen gebruikt worden.

Complicaties

- De kans op infectie en/of bloeding is zeer klein.
- De kans op een netvliesloslating (secundaire ablatio retinae) is kleiner dan 3%.
- 30% van de patiënten heeft na 3 maanden nog een zwelling van de gele vlek (maculaoedeem). Hiervoor is intravitreale therapie (injecties) nodig.
- Indien er gaatjes in het netvlies (retinadefecten) tijdens de operatie zijn, dan worden deze met laser of cryocoagulatie behandeld. Hierdoor kan in enkele gevallen een aantal maanden sprake zijn van een vergrote pupil.
- In een deel van ogen die geopereerd zijn, kan (meestal) tijdelijk een verhoogde oogdruk optreden. Hiervoor kan een behandeling met extra oogdruppels of tabletten nodig zijn.

Aanvullende informatie is te vinden op www.oogartsen.nl.

Controles

Er zijn meestal 3 controlemomenten na een glasvochtoperatie: 1 dag na de operatie, 3-4 weken na de operatie en 2-3 maanden na de operatie. Indien er onverwachte problemen zijn na de operatie, kunnen er meer controles nodig zijn.

Sommige patiënten worden vanuit elders verwezen. Wij proberen daarom zoveel mogelijk rekening te houden met uw reistijd. Daarom plannen wij de controle 1 dag na de operatie en de controle 2-3 maanden na de operatie bij uw eigen oogarts.

Vragen?

Polikliniek oogheelkunde, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur: (040) 888 63 60

Buiten kantooruren en in het weekend: Spoedeisende hulp (eerste hulp) Veldhoven, (040) 888 88 11

Notities

Heeft u vragen over uw behandeling? We raden u aan ze hier op te schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet.