

Manometrie: Drukmeting in de slokdarm

Het onderzoek, drukmeting in de slokdarm, vindt plaats op:

Datum:

Dag/tijdstip :daguur

Nuchter vanaf.....uur

Wilt u zich melden bij: Endoscopie- en behandelafdeling op route 200, locatie **Eindhoven**.

U heeft met uw specialist afgesproken dat binnenkort de druk in uw slokdarm wordt gemeten via een manometrie. In deze folder informeren wij u over dit onderzoek.

U leest in deze folder:

- Wat we precies onderzoeken;
- Hoe het onderzoek gaat;
- Wat er gebeurt na het onderzoek.

Deze folder is bedoeld als aanvulling op dat wat uw specialist u verteld heeft. Hier kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Wat is een drukmeting in de slokdarm (manometrie)?

Het voedsel dat u doorslikt komt terecht in de slokdarm. De voortgeleide bewegingen van de slokdarm zorgen dat het voedsel naar de maag wordt geduwd. Als u kramp voelt, last heeft van pijn op de borst of als voedsel te traag door uw slokdarm zakt, kan er iets mis zijn met de bewegingen in de slokdarm. Een zogenaamde drukmeting in de slokdarm kan dan helpen bij het verklaren van de klachten en het stellen van een juiste diagnose. Dit onderzoek noemen we manometrie. 'Mano' betekent 'druk', 'metrie' betekent 'meting'.

Het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de Endoscopie- en behandelafdeling, locatie **Eindhoven**, route 200. Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. Via de neus wordt een slangetje (sonde) in de slokdarm gebracht. Dit slangetje heeft meerdere drukpunten op verschillende afstanden. Deze geven de druk weer op een computerscherm. Terwijl u

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

regelmatig een slokje water doorslikt, wordt via de sonde de druk in de slokdarm gemeten. Na het onderzoek wordt de sonde uit uw neus verwijderd en mag u naar huis.

Voor het onderzoek

Het inbrengen van de sonde veroorzaakt soms kokhalzen. Om te voorkomen dat er braaksel omhoog komt, mag u tot twee uur vóór het onderzoek niet meer drinken en tot zes uur vóór het onderzoek niet meer eten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u weer alles doen zoals u gewend bent. U mag ook weer alles eten en drinken. De verzamelde gegevens worden verwerkt en de resultaten worden aan uw specialist doorgegeven. Bij uw volgende bezoek aan de polikliniek hoort u de uitslag.

Belangrijke telefoonnummers

Heeft u nog vragen over het onderzoek of kunt u niet op de afgesproken tijd aanwezig zijn voor het onderzoek? Bel dan tijdens kantooruren met de Endoscopie- en behandelafdeling op telefoonnummer (040) 888 6370.

Notities

Heeft u vragen over uw behandeling?

We raden u aan ze hier op te schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet.