

Coagulatie (wegbranden) van blaaspoliepen

Soms wordt er tijdens een cystoscopie, een inwendig kijkonderzoek van de blaas en de plasbuis, een kleine blaaspoliep gevonden die zo klein is dat de uroloog deze poliklinisch kan verwijderen. Deze ingreep wordt uitgevoerd met een coagulatiescopie en wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als een cystoscopie. In deze folder leest u wat deze ingreep inhoudt en wat u daarbij kunt verwachten.

Vorbereiding

Bloedverduunners kunt u in principe blijven gebruiken, tenzij de arts dit anders aangeeft. U krijgt via een katheter verdoving in de blaas. Hierna wordt de katheter verwijderd en neemt u weer plaats in de wachtkamer. U mag de verdoving niet uitplassen. De verdoving heeft 20 tot 30 minuten nodig om optimaal te werken. Daarom wordt er van u gevraagd zich een half uur voor de afspraak te melden.

U wordt hierna uit de wachtkamer geroepen door een verpleegkundige. De verpleegkundige assisteert de arts tijdens de ingreep. U wordt naar een kleedkamer gebracht, waar u uw kleding van het onderlichaam uittrekt. De kleding van het bovenlichaam houdt u gewoon aan. Hierna neemt u plaats in de behandelstoel. U ligt met uw benen in beensteunen. De penis of schede wordt gereinigd met water.

De ingreep: het verwijderen van de poliep

De uroloog brengt de cystoscoop (camera) via de plasbuis in de blaas. De blaas wordt via de camera gevuld met water. Hierdoor ontplooit de blaas, zodat de uroloog een goed beeld krijgt. Door de spoelvloeistof kunt u aandrang tot plassen krijgen. Geeft u vooral aan wanneer u deze aandrang krijgt, dan wordt de blaas niet verder gevuld. De uroloog zoekt de kleine poliep op. Daarna schuift de uroloog een dun draadje door de cystoscoop waarmee hij het poliepje weg kan branden. De ingreep zelf duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem. Als er weefsel wordt opgestuurd voor onderzoek krijgt u een afspraak mee voor het bespreken van de uitslag.

Bijwerkingen

Het eerste uren na de ingreep kunt u een branderig gevoel hebben bij het plassen en een versterkte plasdrang. Bij sommige patiënten houdt dit enkele dagen aan. Er kan wat bloed en weefsel in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Het is belangrijk dat u na de ingreep veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Heeft u na de ingreep langdurig klachten, veel pijn of koorts boven 38,5 graden? Of kunt u moeilijker plassen? Neem dan contact op met de polikliniek urologie of de eerste hulp tussen 17.00 uur 's avonds en 08.00 uur 's ochtends als uw klachten niet kunnen wachten tot de volgende dag.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de informatie die u van uw specialist heeft ontvangen.

- Heeft u vragen, stel deze dan aan uw specialist tijdens uw volgende bezoek of aan de verpleegkundige op de afdeling.
- Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek urologie: (040) 888 83 90.
- Bekijk [deze video](#) bij vragen over de kleur van uw urine.
- Mocht u na uw ingreep last hebben van urineverlies, dan mag u contact opnemen met de polikliniek en vragen naar de continëntieverpleegkundigen. Zij kunnen met u meekijken naar passende materialen en eventuele vergoeding hiervan.