

Patiënten informatie SGLT2-remmer

Hartfalen met diabetes (Dapagliflozine, Empaglifozine)

Toename urineproductie

U gaat meer plassen en u kunt gewicht verliezen.

Verlaging van de bloeddruk

Dit medicijn kan een klein effect hebben op uw bloeddruk. Informeer uw cardioloog/verpleegkundig specialist als u duizelig bent bij het opstaan.

Volg de 'Sick Day Rules' > tablet niet innemen:

- als u zich ziek voelt en niet kunt eten of drinken;
- bij koorts;
- bij braken of waterdunne diarree.

Zorg voor een goede dagelijkse hygiëne

- iedere dag schoon ondergoed;
- was dagelijks de huid van de vagina en penis (voor mannen ook onder de voorhuid);
- droog de huid na een toiletbezoek.

Heeft u pijn bij het plassen of een branderig gevoel?

Neem dan contact op met uw huisarts. Deze medicijnen kunnen een hoger risico geven op een infectie aan urinewegen en genitaliën.

Heeft u last van roodheid of jeuk in uw genitale zone?

Neem contact op met de huisarts. Deze zal u onderzoeken op een urineweg infectie en zo nodig behandelen. Neem contact op met de cardioloog/verpleegkundig specialist om te overleggen of het medicijn gestopt moet worden.

Patiënten informatie SGLT2-remmer

Hartfalen met diabetes (Dapagliflozine, Empaglifozine)

Toename urineproductie

U gaat meer plassen en u kunt gewicht verliezen.

Verlaging van de bloeddruk

Dit medicijn kan een klein effect hebben op uw bloeddruk. Informeer uw cardioloog/verpleegkundig specialist als u duizelig bent bij het opstaan.

Volg de 'Sick Day Rules' > tablet niet innemen:

- als u zich ziek voelt en niet kunt eten of drinken;
- bij koorts;
- bij braken of waterdunne diarree.

Zorg voor een goede dagelijkse hygiëne

- iedere dag schoon ondergoed;
- was dagelijks de huid van de vagina en penis (voor mannen ook onder de voorhuid);
- droog de huid na een toiletbezoek.

Heeft u pijn bij het plassen of een branderig gevoel?

Neem dan contact op met uw huisarts. Deze medicijnen kunnen een hoger risico geven op een infectie aan urinewegen en genitaliën.

Heeft u last van roodheid of jeuk in uw genitale zone?

Neem contact op met de huisarts. Deze zal u onderzoeken op een urineweg infectie en zo nodig behandelen. Neem contact op met de cardioloog/verpleegkundig specialist om te overleggen of het medicijn gestopt moet worden.

Bloedsuiker

- Monitor uw bloedglucose spiegels als u diabetes hebt. Wanneer uw bloedglucose spiegels te laag zijn, neem contact op met uw dokter.

Vermijd een dieet met weinig koolhydraten of ketonen dieet. Dit verhoogt het risico op een tekort aan insuline. Klachten daarvan zijn een ziek gevoel, maagpijn, braken, snel en zwaar ademen, erg slaperig zijn, “zoete” adem.

Heeft u een wond heeft op voeten of benen die niet geneest? Neem dan contact op met uw huisarts of behandelaar. Mogelijk moet het medicijn gestopt worden.

Bloedsuiker

- Monitor uw bloedglucose spiegels als u diabetes hebt. Wanneer uw bloedglucose spiegels te laag zijn, neem contact op met uw dokter.

Vermijd een dieet met weinig koolhydraten of ketonen dieet. Dit verhoogt het risico op een tekort aan insuline. Klachten daarvan zijn een ziek gevoel, maagpijn, braken, snel en zwaar ademen, erg slaperig zijn, “zoete” adem.

Heeft u een wond heeft op voeten of benen die niet geneest? Neem dan contact op met uw huisarts of behandelaar. Mogelijk moet het medicijn gestopt worden.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.