

Ontslagadviezen liesbreuk bij kinderen

- Als de behandeling onder narcose heeft plaatsgevonden, op de dag van de behandeling licht verteerbaar eten. De volgende dag kan uw kind weer gewoon eten en drinken.
- Na 2 dagen weer douchen.
- Niet baden of zwemmen gedurende 2 weken.
- Pleister laten zitten gedurende 1 week.
- Wond droog houden.
- Indien uw kind luiers draagt deze extra vaak verschonen.
- Uw kind mag na 2 – 3 dagen weer rustig fietsen en spelen.
- Bij pijn paracetamol gebruiken volgens afspraak.

Neem contact op bij:

- toenemende pijnklachten die niet verminderen na het innemen van pijnstillers
- temperatuur boven 38,5 °C
- hevig bloedende wond
- toenemende roodheid en zwelling rondom de wondjes

Heeft u vragen?

- **Op de dag van opname** kunt u tot 19.00 uur contact opnemen met de Dagbehandeling: 040 - 888 9280.
- **Tussen 19.00 en 08.30 uur** kunt u contact opnemen met de Spoed Eisende Hulp: 040 - 888 8811.
- **Na de dag van opname** kunt u contact opnemen met de polikliniek: Chirurgie: 040 - 888 85 50.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.