

Topiramaat

Medicatie om migraineaanvallen te verminderen

Deze informatiefolder geeft u slechts een beknopt informatieoverzicht over uw medicijn. Voor de volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluiter en het advies van uw arts en apotheker.

Wat heeft u gekregen?

U heeft topiramaat voorgeschreven gekregen. Dit is een medicijn dat bedoeld is om uw migraine in de toekomst te verminderen. Het doel is om de ernst en het aantal migraine aanvallen te verminderen. Topiramaat wordt ook gebruikt bij de behandeling van epilepsie.

Afhankelijk van de frequentie en variatie van uw migraineklachten, kan pas na een bepaalde periode een uitspraak gedaan worden over het effect. De duur van deze periode bespreekt u met uw arts.

Gebruiksaanwijzingen

U neemt dit medicijn dagelijks in. Afhankelijk van de dosering is dat eenmaal of tweemaal daags. Dit hoort u van uw arts en leest u op het recept en/of medicijndoosje.

Met uw arts bespreekt u of, en wanneer, de dosering aangepast moet worden. Bij (hinderlijke) bijwerkingen dient u het ophogen eerst met uw arts te bespreken. Bijwerkingen kunnen verminderen na 1-2 weken door gewenning. Het effect kan pas na minimaal 3 maanden goed worden beoordeeld.

De maximale dosering voor migraine is 100mg/dag.

Bijwerkingen

Een aantal van de mogelijke bijwerkingen die kunnen optreden zijn:

- Gewichtsafname
- Duizeligheid
- vermoeidheid/slaperigheid
- tintelingen
- maag-darmklachten
- somberheid

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Minder vaak treden woordvindproblemen en gestoorde coördinatie op. Leest u voor het volledige overzicht uw bijsluiter.

Kunt u er andere medicatie naast gebruiken?

Het is van belang dat u bij uw arts en apotheker aangeeft welke andere medicatie u neemt en de bijsluiter goed leest. Allereerst is het van groot belang te melden dat de werkzaamheid van orale anticonceptiva ('de pil') verminderd is bij gelijktijdig gebruik van topiramaat. Topiramaat verhoogt dosisafhankelijk (vanaf doses van 200 mg/dag) de uitscheiding van ethinylestradiol, waardoor de betrouwbaarheid van anticonceptiva (pil, vaginale ring, anticonceptiepleister) kan afnemen. De NVN-richtlijn Epilepsie adviseert voor betrouwbare anticonceptie, bij gebruik van een CYP3A4-enzyminducerend anti-epilepticum, bij voorkeur een levonorgestrel bevattend spiraaltje of een koperhoudend spiraaltje.

Pas verder op met de combinatie met andere medicijnen tegen epilepsie. Gelijktijdig gebruik met o.a. een aantal antidepressiva kunnen leiden tot verhoogde bloedwaarden. De bijsluiter toont een volledig overzicht van mogelijke interacties.

Zwangerschap

Tijdens zwangerschap dient het middel niet gebruikt te worden in verband met een verhoogde kans op aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kind. De bijsluiter toont een volledig overzicht van risico's en mogelijke gevolgen.

Autorijden

Eerste week niet autorijden.

Welke soorten en merken topiramaat zijn er geregistreerd voor migraine?

- ☐ Topiramaat
- ☐ Topamax®