


Apexresectie

In medische termen heet het operatief wegnemen van de wortelpunt en ontsteking van een tand of kies een apexresectie. Deze folder geeft informatie over de chirurgische behandeling, de verzorging en klachten na de behandeling van een ontstoken wortelpunt.

De behandeling

Het wegnemen van de wortelpunt en ontsteking gebeurt onder plaatselijke verdoving. Het tandvlees wordt aan de zijkant van de kaak losgemaakt. Vervolgens verwijdert de kaakchirurg de wortelpunt en het ontstoken weefsel rondom de wortelpunt. Soms wordt het wortelkanaal gevuld, daarna wordt het tandvlees teruggeplaatst en gehecht.



Duur van de behandeling

De behandeling duurt 15 tot 30 minuten, afhankelijk van welke tand of kies behandeld wordt.

Klachten na de behandeling

Klachten die kunnen optreden na de behandeling zijn:

- **Zwelling van het gelaat**

Als reactie op de behandeling kan de wang en/of de lip zwellen. Om deze zwelling tegen te gaan, kunt u het betreffende gelaatsdeel met behulp van ijsblokjes of een coldpack koelen. Bescherm de huid tegen bevriezing door een washandje om de ijsblokjes of coldpack te doen. U koelt het gelaatsdeel meteen bij thuiskomst ongeveer 15 minuten per uur en alleen de eerste dag.

Na 3 dagen is de zwelling meestal maximaal. Daarna moet de zwelling afnemen, om tenslotte geheel te verdwijnen. Ook kan de huid blauw en vervolgens geel verkleuren.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Als gevolg van de zwelling kan het normaal openen van de mond wat moeizamer zijn. Blijf met een zwelling zoveel mogelijk uit de zon.

- **Last hebben na de operatie**

Gebruik na de behandeling Paracetamol 4 x per dag 1000 mg op vaste tijden. Begin met het innemen van de eerste pijnstiller voordat de verdoving is uitgewerkt. De verdoving werkt meestal 2 tot 4 uur. Indien u van de kaakchirurg een ander medicatieadvies heeft ontvangen, dan kunt u dat zoals geadviseerd innemen, naast de paracetamol.

- **Temperatuurverhoging**

De eerste paar dagen na de behandeling is het mogelijk dat u een lichte temperatuurverhoging heeft. Dit is normaal na deze behandeling.

Algemene richtlijnen

- Een goede mondhygiëne na een behandeling is erg belangrijk. Daags na de behandeling kunt u het wondgebied weer voorzichtig poetsen. De rest van uw gebit kunt u normaal poetsen.
- U kunt de eerste vijf dagen beter niet roken! Dat is slecht voor de wondgenezing.
- U kunt na de behandeling normaal eten en drinken wat mogelijk is, laat warme dranken eerst wat afkoelen.
- De hechtingen lossen vanzelf op na 10 tot 14 dagen, behalve wanneer dit anders is vermeld. In dat geval heeft u een afspraak gekregen om de hechtingen te verwijderen.

Belangrijk!

De eerste dag na de behandeling kan de wond nog een beetje bloeden. Dat gaat vanzelf over. Zo niet, neemt u dan contact met op met de polikliniek kaakchirurgie.

U dient tevens contact op te nemen bij:

- zeer forse zwelling
- hevige last, die niet te onderdrukken is met de voorgeschreven middelen
- bij hoge koorts (39°C of hoger), toenemende slikklachten en algehele malaise

Heeft u vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze folder, neemt u dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek kaakchirurgie via telefoonnummer (040) 888 84 70.

's Avonds of in het weekend kunt u de afdeling Spoedeisende Hulp (eerste hulp) bellen op telefoonnummer (040) 888 88 11. Vraagt u naar de dienstdoende kaakchirurg.