

Botoxinjecties

Bij de behandeling van achalasie of spasmen aan de pylorus (maaguitgang) worden soms ook botox injecties geplaatst. Bij achalasie opent de onderste kringspier van de slokdarm zich niet goed (verkrampde sluitspier) en is de peristaltiek in de slokdarm onvoldoende. Deze behandeling wordt ingezet als andere behandelingen onvoldoende geholpen hebben.

De verkrampde kringspier reageert, net als andere spieren, op spierverslappende middelen zoals botulinetoxine, beter bekend als botox.

Hoe werkt het inspuiten van botox?

De botox wordt ingespoten in de onderste slokdarmkringspier: dit zorgt voor verlamming van deze spier, zodat de verkramping van de onderste slokdarmkringspier wordt opgeheven en voedsel weer kan passeren. Voor een verkramping van de kringspier aan de uitgang van de maag (pylorus) geldt hetzelfde.

Het injecteren van botox gebeurt meestal onder een 'roesje', maar is niet erg pijnlijk. Het effect is echter tijdelijk, als de botox medicatie is uitgewerkt verkrampst de kringspier immers weer. Dit is meestal na 3-4 maanden het geval. Daarom zijn deze injecties meestal geen lange termijnoplossing voor achalasie of pylorusspasme.

Zie verder ook de gastroscopie folder.

Vragen?

Heeft u nog vragen neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Maag-darm- leverziekten, telefoonnummer: (040) 888 63 70. Buiten kantooruren: Spoedeisende Hulp (040) 888 88 11.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.