

Patiëntinstructie medicatie huidtesten

Binnenkort wordt u verwacht op de polikliniek allergologie voor een allergietest. Wilt u zo vriendelijk zijn om onderstaande instructies aandachtig door te lezen, zodat de test doorgang kan vinden op de afgesproken datum/tijd. Indien u een van de onderstaande medicijnen slikt, is het van belang dat u tijdig de inname daarvan staakt, omdat deze medicijnen de uitslag van de test beïnvloeden.

Via de mond in te nemen middelen tegen allergie:

Deze medicatie 3 dagen voor de allergietest niet meer innemen!!!

Acrivastine	Mizollen (mizolastine)
Aerius (desloratadine) 5 dagen	Nedeltran (alimemazine)
Alimemazine	Navicalm (hydroxyzine)
Allerfre (loratadine)	Neoclarityn
Atarax (hydroxyzine)	Oxomemazine
Cetirizine (cetirizine)	Oxatomide
Cinnarizine (cinnarizine)	Periactin (cyproheptadine)
Chloorcyclizine	Phenergan (promethazine)
Claritine (loratadine)	Polaramine (dexchlorfeniramine)
Clemastine	Prevalin Allerstop (cetirizine)
Cyclizine (cyclizine)	Promethazine (promethazine)
Cyproheptadine	Ranitidine
Desloratadine 5 dagen	Reactine (cetirizine)
Dexchlorfeniramine	Rupatadine/Rupafin
Dimetindeen	Semprex (acrivastine)
Doxylamine	STP-free
Ebastine	Suprimal (meclozine)
Emesafene (meclozine/pyridoxine)	Tavegil (clemastine)
Fenistil (dimetindeen)	Telfast (fexofenadine)
Fexofenadine	Terfenadine
Hydroxyzine (hydroxyzine)	Tinset (oxatomide)
Kestine (ebastine)	Toplexil
Ketotifen (ketotifen)	Triludan (terfenadine)
Levocetirizine	Xonvea
Loratadine stroop/tabletten	Xyzal (levocetirizine)
Mebhydroline	Zaditen (ketotifen)
Meclozine	Zantac
Mizolastine	Zyrtec (cetirizine)

Hoe tevreden bent u over uw specialist of ziekenhuis? Geef uw mening op [ZorgkaartNederland.nl](https://www.zorgkaartnederland.nl)

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Hoestdranken:

Deze hoestsiropen 2 weken voor de allergietesten niet meer innemen!!!!

Promethazine stroop

Natterman (promethazine)

Systemische corticosteroiden:

Indien u prednisolon, prednison, dexamethason, hydrocortison, cortison, fludrocortison, triamconolon injecties of methylprednisolone/lidocaine injecties gebruikt of onlangs toegediend heeft gekregen, wilt u dit dan per ommekeer melden. Het gebruik van deze medicijnen kunnen de allergietest negatief beïnvloeden. Deze medicijnen niet stoppen zonder voorafgaand overleg met uw behandelaar.

Medicatie voor te hoge bloeddruk en sommige antidepressiva kunnen eveneens de testuitslag beïnvloeden. Meldt u het gebruik hiervan.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de polikliniek allergologie.

Telefoon: 040-8885589

Wij zijn bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.