

Lymfescintigrafie van de armen

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat binnenkort een Lymfescintigrafie van de armen wordt gemaakt. In deze folder informeren wij u over dit onderzoek. Het kan zijn dat het in uw situatie anders is.

Uw afspraak vindt plaats op locatie Veldhoven.

Zwangerschap/Borstvoeding

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding, meldt dit dan aan de afdeling nucleaire geneeskunde.

Lymfklierscintigrafie van de armen

Een lymfklierscintigrafie van de armen is een onderzoek waarbij wordt nagegaan of het transport van lymfvocht door lymfbanen en lymfklieren in de armen en oksel verstoord is. Het onderzoek wordt gedaan met een radioactieve stof. Deze radioactieve stof (99mTechnetium) wordt onder de huid tussen de pink en de ringvinger ingespoten. Deze stof stroomt via de lymfbanen en lymfklieren naar de oksel en dan verder het lichaam in.

De voorbereiding

Voor het onderzoek is geen voorbereiding noodzakelijk. U mag geen steunverbanden dragen.

Het onderzoek

Op de afdeling spuit de medisch nucleair werker met een injectiespuit een kleine hoeveelheid radioactieve stof net onder de huid tussen de pink en de ringvinger van beide handen. Direct na de injectie wordt gedurende 30 seconden een foto gemaakt van de beide handen. Behalve de prikjes voelt u niets. U krijgt het niet extra warm en u wordt er niet misselijk of akelig van. Precies 45 minuten na injectie en zes uur na injectie, worden foto's gemaakt van de handen, armen, oksels en buik. Tijdens de wachttijden probeert u het lymfevochttransport te stimuleren door uw armspieren aan te spannen.

De duur van het onderzoek

Indicatie voor de tijdsduur van het onderzoek:

- | | |
|---|------------|
| • Inspuiting en 1 ^e serie foto's | 10 minuten |
| • 2 ^e serie foto's na 45 min | 20 minuten |
| • 3 ^e serie foto's na 6 uur | 45 minuten |

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

De wachttijd tussen de 2e en 3e serie foto's hoeft u niet op de afdeling of in het ziekenhuis te blijven.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. De rijvaardigheid is niet beïnvloed. U kunt gewoon eten en drinken.

De mogelijke risico's en complicaties

Radioactiviteit is een natuurlijk verschijnsel dat altijd en overal aanwezig is. Het komt van nature in kleine hoeveelheden voor in de bodem, de lucht, ons voedsel, de muren en zelfs in uw eigen lichaam. De extra straling die u ontvangt bij dit onderzoek is gering en vormt geen gevaar voor uw omgeving.

Belangrijk

- Neem bij verhindering zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde, telefoonnummer (040) 888 90 10.
- Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde, telefoonnummer (040) 888 90 10.
- U kunt uw vragen ook stellen vlak voor, tijdens en na het onderzoek.
- Vragen over de uitslag stelt u aan uw behandelend specialist.