

Sondage/Pterygium/Chalazion

Ontslagadviezen voor thuis

- Als de behandeling onder narcose heeft plaatsgevonden is het raadzaam op de dag van de behandeling licht verteerbaar te eten. De volgende dag kunt u weer alles eten en drinken.
- U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek.
- Heeft u pijnstilling meegekregen dan gebruikt u deze de eerste 3 dagen. Daarna mag u bij pijnklachten 3 tot 4 x daags 2 tabletten paracetamol à 500 mg innemen.

Neem contact op

- Bij toenemende pijnklachten die niet verminderen na het innemen van pijnstillers
- Bij een temperatuur boven 38,5 °C
- Bij een bloedend oog
- Bij toenemende druk op het oog

Heeft u vragen:

- **Op de dag van opname** kunt u tot 19.00 uur contact opnemen met de Dagbehandeling: 040 - 888 9280.
- **Tussen 19.00 en 08.30 uur** kunt u contact opnemen met de Spoed Eisende Hulp: 040 - 888 8811.
- **Na de dag van opname** kunt u contact opnemen met de polikliniek: Oogheelkunde: 040 - 888 63 60.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.