

Ooglidcorrectie bij ectropion / entropion

Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en functie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. De onderoogleden kunnen - vooral op oudere leeftijd - naar binnen of naar buiten draaien. Deze afwijkingen kunnen irritatie van de ogen en verslechtering van het zien veroorzaken. Een ingreep kan uitkomst bieden.

Wat is een ectropion?

Een ectropion is een naar buiten gedraaid onderooglid.

Oorzaak

Met het ouder worden verslapt het onderooglid in horizontale richting. Hierdoor gaat het lager hangen en kantelt het naar buiten. Dit kan ook komen door littekens of huidziekten.


Verschijnselen

Een naar buiten gedraaid ooglid veroorzaakt irritatie van het oog, tranen, roodheid en gevoeligheid voor fel licht en wind.

Ingreep

Meestal wordt het ectropion onder plaatselijke verdoving behandeld. Het onderooglid wordt daarbij ingekort. Met hechtingen wordt het onderooglid weer vastgezet. De hechtingen worden na een week op de polikliniek verwijderd.

Ectropion lower eyelid



Links een normaal oog en rechts een ectropion

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Wat is een entropion?

Een entropion is een naar binnen gedraaid onderooglid.

Oorzaak

Ook deze afwijking is meestal het gevolg van veroudering of littekens.

Verschijselen

Doordat het ooglid naar binnen is gedraaid, wrijven de wimpers tegen het oog. Dit veroorzaakt een rood geïrriteerd oog. Wanneer het entropion niet wordt behandeld, is er een risico dat het hoornvlies wordt beschadigd door het schuren van de ooglidhaartjes. Er kan dan een wond op het hoornvlies ontstaan.

Ingreep

Meestal wordt het entropion onder plaatselijke verdoving behandeld. Er wordt een sneetje gemaakt in het onderooglid. Met hechtingen wordt het onderooglid weer naar buiten gekanteld. Is het onderooglid erg slap, dan wordt het ooglid ook ingekort. De hechtingen worden na een week op de polikliniek verwijderd.

Complicaties/risico's

Soms komt het voor dat na de operatie het ooglid niet in de gewenste stand komt en kan een tweede ingreep nodig zijn. Ooglidoperaties zijn in het algemeen niet gevaarlijk. Echter ook aan deze operaties is een zeker risico verbonden. Een blauw oog komt vaak voor, maar geneest snel (binnen 10 tot 14 dagen). Een bloeding of infectie treedt zeer zelden op.

Wanneer na een ooglidoperatie het oog naar voren komt of het oog zeer slecht gaat zien, neem dan contact op met de poli oogheelkunde op telefoonnummer (040) 888 6360. Buiten kantoortijden belt u met de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (040) 888 8811.

Bloed verdunnende medicijnen

In overleg met de oogarts stopt u voor de ingreep met bloed verdunnende medicijnen.

Ook andere medicijnen kunnen invloed hebben op de ingreep. Geef daarom aan de oogarts of assistenten door welke medicijnen u gebruikt.

Belangrijke telefoonnummers

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bel dan met de polikliniek oogheelkunde, telefoonnummer (040) 888 63 60. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur.

Bronvermelding: NOG