

Reuma en vaccinatie

Een ander woord voor vaccinatie is inenting. U kent een inenting misschien wel van kinderen die een aantal vaste inentingen krijgen om bepaalde ziektes te voorkomen. Volwassenen krijgen ook soms inentingen, bijvoorbeeld als u op reis gaat naar een land met een tropisch klimaat.

Grieprik

Als u een vorm van ontstekingsreuma heeft, krijgt u van de huisarts een oproep voor de grieprik. De gevolgen van griep kunnen ernstig zijn als uw afweer minder goed werkt. Griep kan uw reumatische aandoening verergeren en dit kan risico's voor uw gezondheid met zich meebrengen. U beslist zelf of u de grieprik wilt halen, u bent dit niet verplicht. Als u twijfelt, dan kunt u het eventueel met uw behandelaar van onze polikliniek bespreken.

Gebruikt u Rituximab? Dan is het van belang dat de grieprik vier weken voor en tenminste vier maanden na het infuus wordt gegeven. Bespreek dit tijdig met uw behandelaar of huisarts.

Pneumokokken

Heeft u een vorm van ontstekingsreuma, dan is het aan te bevelen om u in te laten inenten tegen pneumokokken als u hiervoor een oproep krijgt van de huisarts. Pneumokokken is een bepaald soort bacterie waar u ernstige ontstekingen door kan krijgen, zoals een longontsteking.

Gebruikt u Rituximab? Bij dit medicijn mag u van vier weken voor tot tenminste vier maanden na uw infuus niet worden ingeënt tegen pneumokokken.

Welke vaccinaties mag u niet nemen?

Vaccinaties met (verzwakt) levend vaccin mogen niet bij de meeste reumamedicijnen als Methotrexaat, Leflunomide, Biologicals, JAK-remmers en Prednison in hogere dosering. Dit zijn bijvoorbeeld vaccinaties voor verre buitenlandse bestemmingen (reizigersvaccinaties) zoals vaccinaties voor buiktyfus, tuberculose of gele koorts. Als u plannen heeft komende jaren naar een land te reizen waarvoor u een dergelijke vaccinatie nodig heeft, bespreek dit dan met uw behandelaar.

Hoe tevreden bent u over uw specialist of ziekenhuis? Geef uw mening op [ZorgkaartNederland.nl](https://www.zorgkaartnederland.nl)

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Wanneer werken vaccinaties minder goed?

Bij het gebruik van afweer-onderdrukkende medicijnen kunnen sommige inentingen minder goed werken. Dit komt doordat uw afweersysteem minder sterk reageert. De vaccinatie-arts kan soms aan de hand van bloedonderzoek kijken wat het effect van de vaccinatie was en of het nodig is om die nog een keer te herhalen.

Meer informatie

Over dit onderwerp is online veel te vinden. Een goede bron voor dit onderwerp is de website van ReumaNederland. <https://reumanederland.nl/reuma/veelgestelde-vragen/over-inentingen-en-reuma/>

Bronvermelding voor het tot stand komen van deze folder: ReumaNederland