

Aanvullende informatie coloscopie bij Colostoma (en/of endoscopie van de rectumstomp)

Vorbereiding op het onderzoek

Stomamateriaal

Het is handig om andere stomazakjes te bestellen om te gebruiken gedurende de voorbereiding. Een ileostomazakje in een grote maat (zakjes voor een dunne darm stoma). Dit zijn zakjes die van onderen te openen zijn en dus geleege kunnen worden. Dit is noodzakelijk bij het laxeren. Ook direct na het onderzoek is een ileostomazakje gemakkelijk in gebruik. Elk merk heeft zijn eigen ileostomazakjes.

Als u niet weet welk zakje u nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw stomaverpleegkundige (of de leverancier van uw stomamateriaal). Doe dit in ieder geval een week voor het onderzoek, het bestellen hiervan kost namelijk wat tijd. Neem ook extra stomamateriaal mee naar het ziekenhuis, voor na het onderzoek om je stoma te verzorgen.

Vorbereiding voor schone darmen

Het onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden als uw dikke darm helemaal schoon is. Daarom kan het nodig zijn dat u op de dagen vóór het onderzoek moet beginnen met een speciaal dieet en het laxermiddel dat is voorgeschreven. U kunt stoppen met drinken als de productie uit de stoma helder is.

Eindstandig colostoma na een rectumamputatie

Darmvorbereiding alleen oraal met het laxermiddel dat is voorgeschreven. U kunt stoppen met drinken als de productie uit de stoma helder is.

Eindstandig colostoma na Hartmanprocedure

Vorbereiding darm oraal met laxermiddel. U kunt stoppen met drinken als de productie uit de stoma helder is.

Rectumstomp (indien deze ook moet worden nagekeken) voor het onderzoek reinigen met het klysma, wat u zich toedient minimaal 2 uur voordat u naar het ziekenhuis komt.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Dubbelloops colostoma

Hierbij vindt het onderzoek plaats via de stoma en/of via de anus. Het kan mogelijk zijn dat voor het onderzoek de gehele darm nagekeken dient te worden. In dat geval zal de voorbereiding zowel oraal zijn als via de stoma spoelen door de stomaverpleegkundige. Dit hoort u van de MDL verpleegkundige.

U wordt op de ochtend van het onderzoek opgenomen op de dagbehandeling van locatie Veldhoven. De stomaverpleegkundige zal de afvoerende lis naar de anus via u stoma spoelen. Voorbereiding van de aanvoerende lis dient oraal met het voorgeschreven laxeermiddel te gebeuren. U kunt stoppen met drinken als de productie uit de stoma helder is.