

Lokale infiltratie van een perifere zenuw

Pijn kan veroorzaakt worden door een beschadigde of niet goed functionerende kleine zenuw (perifere zenuw). Het doel van de behandeling is om de pijn tijdelijk te verminderen. De injectie zorgt ervoor dat de zenuw minder pijnsignalen doorgeeft.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaken zijn:

- zenuwbeknelling/beschadiging door een operatie
- littekenpijn
- neuroom vorming (ongewenste groei van zenuwweefsel door verwonding/beschadiging)
- chemotherapie
- onbekende oorzaak

Behandeling

Op de pijnlijke plek of rond de zenuw wordt met behulp van een naald een verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmend middel (corticosteroïd) gegeven. De ontstekingsremmer vermindert de zwelling van de zenuw, waardoor de zenuw tot rust kan komen en kan herstellen.

Tijdens deze behandeling neemt u plaats op de behandeltafel. De plaats van behandeling wordt gedesinfecteerd. Met echografie wordt de plaats van de zenuw opgezocht en de naald ingebracht. Daarna worden de medicijnen gegeven en de naald weer verwijderd.

Complicaties en bijwerkingen

- Er kan een allergische reactie door de gegeven medicatie ontstaan.
- Bij mensen met suikerziekte kan de bloedsuiker een aantal dagen verhoogd zijn.
- Vrouwen kunnen opvliegers krijgen en de menstruatiecyclus kan tijdelijk verstoord zijn door de corticosteroïden.
- Er kan tijdelijk een warm of rood gezicht ontstaan.
- **Na de behandeling kan napijn ontstaan. Deze napijn kan enkele dagen tot een week aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.**

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Resultaat

Mogelijk merkt u binnen een aantal dagen al het effect van de behandeling. Het beste resultaat zien we na een aantal weken. Rond deze tijd ontvangt u van ons een vragenlijst via de mail, waarin u het effect van de behandeling kunt aangeven. Als het nodig is wordt er daarna een telefonische afspraak gepland. Het resultaat en eventueel verdere behandeling wordt dan besproken.

Graag deze vragenlijst (3 weken) afwachten voor u contact met ons opneemt. Bij klachten zoals koorts of krachtsverlies mag u eerder contact opnemen. Het resultaat en zo nodig verdere behandeling wordt dan besproken.

Neem contact op:

- Bij toenemende pijnklachten die niet verminderen na het innemen van pijnstillers.
- Bij een temperatuur >38.5 graden.
- Bij toenemende zwelling/roodheid rondom de wond.
- Bij een hevig bloedende wond.
- Bij aanhoudend overgeven en geen eten/drinken kunnen verdragen

Let op

- Informeert u ons alstublieft vóór de behandeling bij een (mogelijke) zwangerschap.
- In de meeste gevallen mogen bloedverdunnende medicijnen door gebruikt worden. Als u toch moet stoppen bespreekt de pijnspecialist dit met u.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U zorgt zelf voor vervoer.
- Bent u allergisch voor medicatie? Meld dit dan vóór de behandeling.
- U mag dezelfde dag de pleister verwijderen die na de behandeling op de huid is geplakt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het centrum voor pijngeneeskunde, telefoonnummer: (040) 888 51 21.