

Bloedverdunners ter preventie van TIA en herseninfarct

U bent gestart of gebruikt al de bloedverdunner clopidogrel (75 mg Grepid), Wij geven hieronder meer informatie over het gebruik van dit medicijn. Soms is er reden om andere dosering clopidogrel of andere bloedverdunners te gebruiken, dan hoort u dat van uw arts.

Gebruik clopidogrel

Het gebruik van het medicijn clopidogrel is in principe voor levenslang gebruik. U slikt hiervan 1x daags, 1 tablet.

In combinatie met de clopidogrel geven we tijdelijk ook acetylsalicylzuur (80mg). Deze gebruikt u 1x daags, 1 tablet.

Na 3 weken wordt de acetylsalicylzuur gestopt en gaat u door met de clopidogrel.

U kunt stoppen met de acetylsalicylzuur per

Heeft u vragen?

Stel deze dan gerust aan uw neuroloog of verpleegkundig specialist.

De polikliniek neurologie is bereikbaar via: 040-888 8410

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.