

Röntgenfoto's van baarmoeder en eileiders

Hysterosalpingografie (HSG)

U heeft met uw gynaecoloog of fertiliteitsarts een afspraak gemaakt voor een röntgen-onderzoek van de baarmoeder en eileiders. Dit noemt men een hysterosalpingografie (HSG). In deze folder informeren wij u over dit onderzoek. De folder is bedoeld als aanvulling op de informatie die u van uw arts heeft ontvangen.

Wat is een hysterosalpingografie?

Een hysterosalpingografie is een röntgenonderzoek waarbij uw arts de vorm van de baarmoeder en de doorgankelijkheid van de eileiders kan bekijken. Om die zichtbaar te maken gebruikt men een contrastmiddel. U kunt tijdens het onderzoek zelf meekijken op een tv-monitor.

Belangrijk

Overgevoeligheid voor jodium en contrastmiddel vooraf melden

Als u weet dat u overgevoelig bent voor jodium, moet u dit van tevoren melden aan uw arts of aan de assistente die helpt bij het onderzoek. Ook als u overgevoelig bent voor contrastmiddel dient u dit aan te geven.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek vindt plaats wanneer het niet lukt om zwanger te raken. Uw arts onderzoekt of de eileiders open zijn. Soms wordt het onderzoek juist gedaan om te controleren of de eileiders goed zijn afgesloten na een sterilisatie.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

De datum en het tijdstip van het onderzoek worden afgesproken wanneer u de datum van de eerste dag van de menstruatie aangeeft of doorbelt. Het onderzoek vindt net ná de menstruatie en vóór de eisprong plaats (ongeveer tussen dag 7 en dag 12 van de cyclus). Het is belangrijk dat er geen kans is op zwangerschap ten tijde van het onderzoek. Als het onderzoek wordt verricht ter controle na een sterilisatie, kan het op elk moment van de cyclus plaatsvinden.

Afspraak maken

Voor een afspraak belt u met de afdeling biometrie, via telefoonnummer (040) 888 95 58. Bent u verhinderd, bel dan tijdig om een nieuwe afspraak te maken.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Vorbereiding thuis

Antibioticum

Om de kans op een infectie door de ingreep te verkleinen, neemt u de avond voor de ingreep 2 tabletten antibiotica in.

Pijnstiller

Voor het onderzoek krijgt u een recept voor een pijnstiller. Ongeveer een uur voordat u naar het ziekenhuis komt, neemt u de pijnstiller in.

Begeleider meenemen naar het ziekenhuis

We raden u aan iemand mee te nemen, die u na afloop van het onderzoek weer naar huis kan brengen.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling radiologie (locatie Eindhoven: 1e etage (route 180), locatie Veldhoven: begane grond, route 55).

Op de afdeling radiologie roept de laborante u binnen. In een daarvoor bestemde aparte ruimte doet u uw onderkleding uit. Daarna gaat u op uw rug op de röntgentafel liggen. De gynaecoloog of fertiliteitsarts brengt een speculum (eendenbek/spreider) in uw vagina in. Daarna wordt de vagina ontsmet met niet bijtende jodium. Het ontsmetten voelt koud aan, maar prikt niet.

De arts schuift een dun slangetje met een klein ballonnetje via de baarmoedermond in de baarmoeder. Na het opblazen van het ballonnetje wordt contrastvloeistof in de baarmoeder en eileiders gespoten. Dit kan buikpijn of kramp veroorzaken die vergelijkbaar is met menstruatiepijn. Deze pijn duurt 1 à 2 minuten.

De contrastvloeistof zorgt ervoor dat uw baarmoeder en eileiders zichtbaar worden op een monitor. De arts kan alles daardoor goed bekijken en zien of uw eileiders voldoende open zijn. Soms wordt er een uur later nog een extra (staande) buikoverzichtsfoto gemaakt. De arts zal dit dan expliciet aangeven aan u.

Het is nooit van tevoren te zeggen hoe pijnlijk het onderzoek is. Wel is bekend dat het soms een onaangenaam onderzoek kan zijn. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Het is mogelijk dat u na het onderzoek wat bloed verliest via de vagina. Ook kunt u wat buikpijn hebben. Als er geen bloedverlies of afscheiding meer is, is er geen bezwaar tegen gemeenschap.

De uitslag

De voorlopige uitslag kan tijdens het onderzoek aan u worden medegedeeld. De definitieve uitslag krijgt u later tijdens de afspraak met uw arts op de polikliniek te horen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze folder? Belt u dan met de afdeling biometrie, via telefoonnummer (040) 888 95 58.