

Behandeling van ijzertekort met Ferinject infuus

Na bloedonderzoek is gebleken dat u een ijzer tekort heeft. Uw specialist heeft daarom een infuus met Ferinject voorgesteld. In deze folder leest u over de behandeling met Ferinject.

Hoe ontstaat ijzertekort

De meest voorkomende oorzaak van ijzertekort is bloedverlies, bijvoorbeeld door een operatie, bevalling of menstruatie of bij bloedverlies uit het maag- darmkanaal. Maar er zijn veel meer oorzaken. Bij chronische ziekten zoals de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, kan ook een ijzertekort ontstaan.

Hoe werkt Ferinject?

Ferinject is een medicijn dat we gebruiken voor de behandeling van bloedarmoede door ijzergebrek. Het doel van de behandeling is het aanvullen van de ijzervoorraden in uw lichaam. IJzer is belangrijk voor een goede werking van verschillende functies in uw lichaam.

Tijdens de behandeling

Ferinject wordt toegediend via een infuus. U wordt hiervoor opgenomen op de dagbehandeling. De toediening van het infuus neemt ongeveer 1 uur in beslag. De verpleegkundige brengt een infuus in bij u en sluit het infuussysteem aan op een infuuspomp. Voorafgaand en na toediening van de Ferinject zullen controles bij u worden gedaan, zoals bloeddruk, hartslag en temperatuur. Nadat de Ferinject is ingelopen krijgt u nog een infuus met vloeistof om na te spoelen.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u weer naar huis. U mag zelf auto rijden. Het medicijn heeft geen invloed op de rijvaardigheid. Gemiddeld genomen merkt u binnen 1 tot 2 weken het effect van de behandeling. De klachten die u door het ijzertekort had, zoals vermoeidheid, zullen verminderen en/of verdwijnen.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- Pijn op de plaats van toediening (branderig/ pijnlijk gevoel, roodheid, zwelling en een blauwe plek);
- Hoofdpijn en duizeligheid;
- Maag-darmklachten, waaronder misselijkheid en braken;
- Buikpijn en verstopping;
- Huiduitslag;
- Spier- en gewrichtspijn.

Het toedienen van ijzer via een infuus kan een (ernstige) overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Een overgevoeligheidsreactie kan ook optreden als een eerdere toediening geen bijwerkingen veroorzaakte. Gebeurt dit tijdens de behandeling dan stopt de verpleegkundige het infuus direct. In overleg met de arts worden de klachten eventueel behandeld met medicijnen.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling of polikliniek waar u onder behandeling bent. Via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis kunt u zich door laten verbinden: (040) 888 8000.