

Ganglion stellatum blokkade

Het ganglion stellatum is een zenuwknoop die onderin de hals ligt, ter hoogte van de zevende halswervel. Het maakt onderdeel uit van het onwillekeurig zenuwstelsel (over dit deel van het zenuwstelsel hebben we zelf geen controle). Bij behandeling van deze zenuwknoop wordt de pijngeleiding verminderd.

Wanneer krijgt u een stellatum blokkade?

Deze behandeling kan worden gedaan bij sommige vormen van pijn in de onderkaak, nek, schouder en arm. Bijvoorbeeld bij pijn door een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). Ook kan het ganglion stellatum een rol spelen bij opvliegers tijdens de overgang.

Behandeling

Voor de zenuwbehandeling zijn er de volgende methoden:

Proefblokkade

Als niet duidelijk is of de pijn kan worden beïnvloed door behandeling van deze zenuwknoop wordt er gestart met een proefblokkade. De zenuwknoop wordt tijdelijk verdoofd met een kortwerkende pijnstiller.

Voor de behandeling van opvliegers in de overgang wordt de zenuw behandeld met deze verdoving. Door het ganglion stellatum tijdelijk of voor langere tijd te verdoven, wordt geprobeerd deze klachten te verminderen. Bij patiënten die deze behandeling krijgen tegen opvliegers, geldt dat voor een aantal weken tot maanden de frequentie en de ernst van de opvliegers zouden kunnen verminderen. Zonodig volgt er een herhaling van deze behandeling.

Voor de behandeling van opvliegers in de overgang wordt de zenuw verdoofd met deze behandeling. Door het ganglion stellatum tijdelijk of voor langere tijd te verdoven, wordt geprobeerd de klachten te verminderen.

Bij patiënten die deze behandeling krijgen tegen opvliegers, kan de frequentie en de ernst van de opvliegers voor een aantal weken tot maanden verminderen. Zo nodig wordt de behandeling herhaald.

PRF-behandeling

De zenuwknoop wordt met radiofrequente stroom verwarmd, waardoor de pijngeleiding voor langere tijd wordt onderbroken.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Tijdens deze behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. De plaats van behandeling wordt gedesinfecteerd en eventueel verdoofd. Met behulp van röntgendoorlichting of echografie wordt de zenuwknoop opgezocht en de naald ingebracht. Eventueel wordt er wat contrastvloeistof ingespoten om de positie van de naald goed te zien. Bij de PRF behandeling wordt met een elektrisch stroompje gecontroleerd of de naald dicht bij de zenuwknoop staat. Dit veroorzaakt een prikkelend, tintelend of drukkend gevoel. Daarna wordt de behandeling uitgevoerd.

Complicaties en bijwerkingen

- Heesheid of slikklachten. Deze klachten verdwijnen na enkele uren vanzelf.
- Hangend ooglid, wazig zien en/of een loopneus. De klachten verdwijnen na enkele uren vanzelf.
- Een warm gevoel in uw wang, nek en/of arm.
- Er is een zeer kleine kans dat de long wordt aangeprikt. Wordt u na de behandeling kortademig, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
- Er kan een allergische reactie door de toegediende medicatie ontstaan.
- **Na de behandeling kunt u nog pijn hebben. Deze napijn kan een paar dagen tot 2 tot 3 weken duren, maar gaat meestal vanzelf over. U kunt hiervoor een pijnstiller gebruiken.**

Resultaat

U kunt binnen een paar dagen al merken dat de behandeling werkt. Het beste resultaat zien we meestal na 6 weken.

Rond deze tijd krijgt u van ons een vragenlijst per e-mail. Hierin kunt u aangeven wat het effect van de behandeling is. Als dat nodig is, plannen we daarna een telefonische afspraak. Dan bespreken we het resultaat en of verdere behandeling nodig is.

Wij vragen u om te wachten met contact opnemen tot u de vragenlijst (na ongeveer 6 weken) heeft ingevuld.

Heeft u klachten zoals koorts of minder kracht? Neem dan eerder contact met ons op.

Let op

- Informeert u ons vóór de behandeling bij een (mogelijke) zwangerschap.
- Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen bespreek dan of u tijdelijk moet stoppen met de bloedverdunners.
- Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit ruim vóór de behandeling.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag **niet** actief aan het verkeer deelnemen. U zorgt zelf voor vervoer.
- Bent u allergisch voor medicatie meld dit vóóraf.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het centrum voor pijngeneeskunde, telefoonnummer: 040 - 888 51 21. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.