

Gastro-intestinaal eiwitverlies

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat binnenkort een scintigrafie van Gastro-intestinaal eiwitverlies wordt gemaakt. In deze folder informeren wij u over dit onderzoek. Het kan zijn dat het in uw situatie anders is.

Uw afspraak vindt plaats op locatie Veldhoven.

Zwangerschap/borstvoeding

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding, meld dit dan aan de afdeling nucleaire geneeskunde

Gastro-intestinaal eiwitverlies

Bij een scintigrafie Gastro-intestinaal eiwitverlies (eiwitlekkage darm lokalisatie) wordt het verlies van eiwitten vanuit het bloed naar de darmen zichtbaar gemaakt. U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve stof (99mTechnetium) toegediend in een bloedvat. Aansluitend worden er foto's gemaakt.

De voorbereiding

Voor dit onderzoek dient u 3 uur vooraf nuchter te zijn. U mag dus niet eten en drinken. Wel mag u met een slokje water uw eventuele medicijnen innemen, behalve de medicijnen die uw darmen beïnvloeden. Medicijnen/prokinetica zoals: Domperidon, Cisapride (Prepulsid) en Metoclopramide (Pimperan) mag u twee dagen voor het onderzoek niet innemen. Na het volledige onderzoek mag u deze medicijnen weer innemen.

Heeft u minder dan drie dagen vóór dit onderzoek een endoscopie of een darm-contrast-studie ondergaan? Bel dan even bellen naar de afdeling nucleaire geneeskunde via (040) 888 90 10.

Wanneer u een darmstoma heeft, neem dan 5 extra stomazakjes mee. Tijdens het onderzoek is het nodig de stomazakjes te wisselen.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd van het onderzoek bij de aanmeldzuil bij de afdeling nucleaire geneeskunde (route 050). U wordt uit de wachtkamer opgehaald en u komt op een onderzoekstafel te liggen. Tijdens het maken van de foto's mag u uw kleding aanhouden. Er mogen geen metalen voorwerpen zoals sleutels of kleingeld in zitten.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Er wordt een infuusnaald in een bloedvat in de arm ingebracht. Via dit infuus wordt de radioactieve stof toegediend. De eerste opname duurt 30 minuten. Met een speciale camera worden er opnamen van de buik gemaakt. Deze camera komt vlak boven u te hangen.

De duur van het onderzoek

Na de eerste opname mag u 30 minuten in de wachtkamer plaatsnemen. Daarna volgt een tweede opname van 10 minuten. Deze opname wordt herhaald na 2 uur, 4 uur en 6 uur na toediening van de radioactieve stof. De eerste dag duurt het onderzoek 6,5 uur.

De volgende dag meldt u zich opnieuw bij de aanmeldzuil en wordt nogmaals 1 opname van 15 minuten gemaakt.

U mag gedurende de dagen van het onderzoek licht verteerbare voeding tot u nemen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. U mag ook zelf autorijden.

De mogelijke risico's en complicaties

Radioactiviteit is een natuurlijk verschijnsel dat altijd en overal aanwezig is. Het komt van nature in kleine hoeveelheden voor in de bodem, de lucht, ons voedsel, de muren en zelfs in uw eigen lichaam. De extra straling die u ontvangt bij dit onderzoek is klein en vormt geen gevaar voor uw omgeving.

Belangrijk

- Neem bij verhindering zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde via (040) 888 90 10.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde. U kunt uw vragen ook stellen vlak voor, tijdens en na het onderzoek.
- Vragen over de uitslag kunt u aan uw behandelend specialist stellen.