


Implantaat ter vervanging van een tand of kies

In deze folder krijgt u informatie over de vervanging van een tand of kies door een implantaat.

Patiënten die door een aangeboren afwijking, ongeval of andere reden een tand of kies missen of kwijtraken, kunnen deze laten vervangen. Aangezien een implantaat de wortel vervangt, is het mogelijk om zonder de gezonde aangrenzende tanden te beschadigen deze tand te vervangen.

Een implantaat

Een implantaat is een kunstwortel gemaakt van een lichaamsvriendelijk metaal (titanium). Deze vervanging van de natuurlijke tandwortel dient als nieuw stevig fundament voor een kroon of brug. Het gedeelte dat op het implantaat en boven het tandvlees zit noemen we de suprastructuur. Bij iedere volwassene kan in principe een implantaat worden geplaatst. Wel is er voldoende kaakbot nodig. Is er te weinig kaakbot dan kan meestal met een extra behandeling nieuw (kunst)bot worden geplaatst.



Voorbeeld implantaat met kroon

Hoe tevreden bent u over uw specialist of ziekenhuis? Geef uw mening op [ZorgkaartNederland.nl](https://www.zorgkaartnederland.nl)

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelijke) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Voor het slagen van de behandeling is een goede motivatie van de patiënt een absolute voorwaarde. Het is van belang het implantaat en de suprastructuur goed te blijven onderhouden. Een goede mondhygiëne is zeer belangrijk voor het succes. Wij raden patiënten roken ten sterkste af. Roken kan de behandeling laten mislukken.

Kosten

Implantaten ten behoeve van kroon- en brugwerk worden niet vergoed door uw basisverzekering. Een aanvullende tandheelkundige verzekering vergoedt een deel van de kosten, afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden. Op de polikliniek kaakchirurgie krijgt u vooraf een prijsopgave. U krijgt de prijsopgave na het consult thuis gestuurd.

Het soort implantaat

De kaakchirurg vertelt u wat voor implantaat er bij u wordt geplaatst. Dit kan een 1-fase of een 2-fase implantaat zijn:

Eén fase implantaat: dit steekt voor een deel door het tandvlees. Na ongeveer 3 dagen mag u het implantaat zachtjes poetsen met een zachte tandenborstel. De eerste dagen kunt u de mondspoeling gebruiken.



Twee fase implantaat: dit implantaat is niet in de mond zichtbaar. Het tandvlees is over het implantaat heen gehecht. U gebruikt de mondspoelvloeistof om het tandvlees schoon te maken. Na 3-6 maanden krijgt u een tweede kleinere ingreep. Het tandvlees boven het implantaat wordt geopend. Het implantaat krijgt een langere opbouw en steekt nu wel door het tandvlees.

De behandeling

De ingreep vindt onder plaatselijke verdoving plaats. Tijdens de behandeling wordt u 'afgedekt' met steriele doeken. Ook ligt er een doek over uw gezicht, maar uw neus en mond liggen vrij. Het tandvlees wordt losgemaakt, zodat het bot zichtbaar wordt. Vervolgens worden gaatjes in het bot geboord. Het implantaat wordt daarna in de kaak geschroefd. Het tandvlees wordt met hechtingen gesloten.

Algemene richtlijnen

- De dag van behandeling mag u niet spoelen. De dag na behandeling kunt u de mond spoelen met het voorgeschreven spoelmiddel.
- Gebruik tegen de pijn de pijnmedicatie die uw arts heeft voorgeschreven. De verdoving is na ongeveer 2 tot 4 uur uitgewerkt. Begin met het innemen van de eerste pijnstiller vóór de verdoving is uitgewerkt.
- Een zwelling kunt u tegengaan door direct na de ingreep het betreffende gelaatsdeel met ijsblokjes/coldpack te koelen. Hiervoor doet u wat ijsblokjes in een washandje en plaatst u dit op de juiste plek op het gelaatsdeel. Dit doet u ongeveer 15 minuten per uur en niet langer dan één dag. Wat ook helpt om de zwelling wat tegen te gaan, is om de eerste nacht wat meer rechtop te slapen (extra hoofdkussens). Na 3 dagen is de zwelling meestal maximaal. Daarna moet de zwelling minder worden, om tenslotte geheel te verdwijnen. Ook kan de huid blauw en vervolgens geel verkleuren. Blijf met een zwelling zoveel mogelijk uit de zon.

Mondhygiëne

Dagelijks moet u de implantaatconstructie goed schoonmaken. Dit kunt u doen met superfloss, ragertjes (soft picks) en tandenborstel. Een mondhygiënist kan u hiervoor goede instructies geven. Goede mondhygiëne is belangrijk voor het behoud van het implantaat. Halfjaarlijkse controle is noodzakelijk.

Tijdschema van de behandeling

Week 1: Direct na de behandeling starten met pijnstillers en mondspoeling en indien nodig antibiotica. Eet de eerste dag niet te warm.

Week 2: Controle afspraak met hechtingen verwijderen.

Week 2-12: Zorg voor een goede mondhygiëne terwijl het implantaat vastgroeit.

Maand 3 tot 6: Bij een twee fase implantaat wordt het tandvlees onder plaatselijke verdoving geopend. De schroeven worden verwisseld. Het implantaat steekt nu door het tandvlees heen.

Ongeveer 2 weken na de schroefwissel start de tandarts met het maken van de nieuwe kroon/brug.

Complicaties/risico's

U neemt contact op met de polikliniek kaakchirurgie bij een nabloeding en/of hevige pijnklachten.

Meer informatie

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA), www.kaakchirurg.nl.

Belangrijke telefoonnummers

Tijdens kantooruren kunt u de polikliniek kaakchirurgie bereiken via telefoonnummer (040) 888 84 70.

's Avonds of in het weekend belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp (eerste hulp), op telefoonnummer (040) 888 88 11, Vraagt u dan naar de dienstdoende kaakchirurg.