

De niet ingedaalde zaadbal

Orchidopexie

Tijdens de zwangerschap ontwikkelen zich bij jongetjes de testikels (zaadballen) in de buik. Ongeveer een maand voor de geboorte zijn de testikels via de lies in de balzak (scrotum) ingedaald. Normaal gesproken heeft een jongetje bij de geboorte dan ook beide zaadballen in de balzak. Soms dalen de zaadballen niet. Een of beide zaadballen blijven dan in de lies of buik zitten. Op latere leeftijd kunnen hierdoor problemen ontstaan met de vruchtbaarheid. Een niet ingedaalde testikel heeft geen invloed op de seksuele functies. Het geeft wel een verhoogd risico op het ontstaan van teelbalkanker. Zijn de zaadballen in het eerste levensjaar (uiterlijk 18 maanden) nog niet ingedaald, dan zet de uroloog deze vast in de balzak. Deze ingreep heet orchidopexie.


Pendelbal

Soms lijkt het of een zaadbal niet is ingedaald, maar kan hij gemakkelijk in de balzak worden geduwd. Dit noemen we een pendelbal. Rond de puberteit komt deze meestal vanzelf op de goede plaats te liggen.

Niet-ingedaalde zaadbal

1. Lies
2. Balzak
3. Niet-ingedaalde zaadbal
4. Plasbuis
5. Ingedaalde zaadbal

© 2007, BSL Praktijk Atlas



De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelijke) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Niet ingedaalde testis

Wanneer de bal in de lies gevoeld wordt, probeert de arts met een strijkende handbeweging naar beneden, deze in de balzak te brengen. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, spreken we van een niet ingedaalde testis. In dat geval vindt er uiterlijk tot 18 maanden een ingreep plaats (orchidopexie), waarbij de teelbal wordt vastgezet.

Vorbereiding ingreep

Meestal wordt uw kind kortdurend in het ziekenhuis opgenomen. De ingreep vindt altijd plaats onder algehele narcose. Op de dag van de ingreep mag uw kind tot 6 uur vóór de operatie een licht ontbijt eten (thee, ranja of water en een beschuitje). Tot 2 uur vóór de behandeling mag uw kind nog ranja, water of thee drinken. Borstvoeding mag tot 4 uur vóór de ingreep gegeven worden. Laat uw kind niet tandenpoetsen als het de mond nog niet kan spoelen, maar het water nog doorslikt. Het is belangrijk uw kind goed voor te bereiden op de operatie. Als hij weet wat hem te wachten staat, hoeft hij niet onnodig bang te zijn.

Wat te doen bij ziekte?

- Heeft uw kind op de ochtend van de ingreep een temperatuur boven 38°C, bel dan de polikliniek urologie;
- Ook als er in de omgeving besmettelijke ziekten voorkomen zoals mazelen, waterpokken, rode hond en bof meldt u dit bij de polikliniek;
- Het telefoonnummer van de polikliniek urologie is (040) 888 83 90. Vanaf 8.30 uur zijn wij te bereiken.

De opname

Na opname op de afdeling gaat u samen met uw kind in het bed naar de inslaapkamer. Daar blaast uw kind in een kapje, zodat hij in slaap valt. Soms wordt er een prikje in de arm gegeven. Als ouder gaat u terug naar de afdeling.

De ingreep

De uroloog maakt een sneetje in de lies. Via dit sneetje wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt. De bloedvaten en de zaadleider van de testikel worden ook vrijgemaakt van de omgevende weefsels. Hierdoor krijgen de bloedvaten en zaadleider voldoende lengte om de testikel naar de balzak te brengen. Daar zet de uroloog deze vast. Als de uroloog tijdens de operatie een liesbreuk vaststelt, dan wordt dit ook meteen verholpen. De huidwond in de lies en balzak wordt meestal met oplosbare hechtingen gesloten. Deze hoeven niet verwijderd te worden. De ingreep duurt ongeveer een uur.

Na de operatie

Op de afdeling mag uw kind weer drinken. Gaat dit goed dan mag u vrij snel na de ingreep naar huis. Wij raden u aan om samen met iemand in de auto naar huis gaan. Er is dan iemand die uw kind extra aandacht kan geven.

Adviezen voor thuis

- Uw kind mag thuis drinken. Geef echter geen koolzuurhoudende dranken;
- Is uw kind niet misselijk dan mag het 's avonds lichte voeding hebben zoals beschuit, bouillon, appelmoes of puree;
- De eerste dag moet uw kind rustig aan doen, dus in bed of op de bank liggen;
- De dag na de operatie kan uw kind weer zijn gang gaan. Waarschijnlijk is uw kind de eerste dagen minder actief;
- Na 2 dagen mag de pleister eraf en mag uw kind kort douchen en/of in bad tot dat de hechtingen opgelost zijn. Daarna mag uw kind weer langer in bad of douchen;
- Houd de wond schoon en droog. Dus na het douchen of wassen de wond droogdeppen;
- Draagt uw kind nog luiers dan kunt u deze het beste vaker verwisselen;
- Bij pijn mag u, volgens voorschrift, een paracetamol zetpil of tabletje geven;
- De balzak is na de ingreep gezwollen en ziet er blauwrood verkleurd uit;
- Uw kind mag 2 weken niet sporten, fietsen of zwemmen;
- Voelt uw kind zich fit dan kan hij weer naar school.

Nacontrole

Na de ingreep krijgt u een afspraak mee voor de polikliniek.

Complicaties

Het is normaal dat de balzak na de operatie gezwollen is en blauw-rood kleurt. Dit verdwijnt vanzelf. Mogelijke complicaties beperken zich bijna altijd tot de wondjes. Zo kan er een nabloeding optreden. U ziet dit als een bloeduitstorting onder de hechting. Dit verdwijnt vanzelf en behandeling is niet nodig. Soms kan er een infectie of zwelling ontstaan. Neem dan contact op met de polikliniek urologie, telefoonnummer (040) 888 83 90 binnen kantoortijden, buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp 040-8888811. Zeer zelden blijkt tijdens de operatie de zaadbal van zo slechte kwaliteit te zijn dat vastzetten niet zinvol is. De zaadbal wordt dan weggehaald.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie deze [informatieve video](#).

Belangrijke telefoonnummers

- Heeft u vragen over de ingreep, neemt u dan contact op met de polikliniek urologie, telefoonnummer (040) 888 83 90.
- Bent u verhinderd bel dan zo snel mogelijk, minimaal 24 uur voor de afspraak, met de polikliniek om een nieuwe afspraak te maken.
- Als u zonder bericht uw afspraak niet nakomt, dan kunnen kosten in rekening gebracht worden.