


Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC-lijn)

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om een Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (PICC-lijn) bij u te plaatsen. Deze folder is bedoeld als aanvulling van de mondelinge informatie. U kunt alles nog eens rustig nalezen. Heeft u vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of verpleegkundig specialist.

Wat is een PICC-lijn?

Een PICC-lijn is een catheter die via een ader van de bovenarm opgeschoven wordt tot bij het hart. Deze lijn is bedoeld voor het toedienen van medicijnen. Als u vaak geprikt wordt, kunnen uw bloedvaten beschadigen. Als dit het geval is, óf juist om dit te voorkomen, kan er een PICC-lijn worden aangebracht. Zo kunnen medicijnen veilig en minder pijnlijk worden toegediend.



De PICC-lijn kan gebruikt worden om tijdens medische onderzoeken (MRI-scan, CT-scan) contrastvloeistof toe te dienen.

Vorbereiding

Indien u bloedverdunners gebruikt dient u dit aan te geven bij de arts. Hij/zij zal bepalen of u hiermee door moet gaan en of er een extra bloedcontrole nodig is.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

De ingreep

Een PICC-lijn wordt door een chirurg ingebracht. Dit vindt plaats onder verdoving op de (poliklinische) operatiekamer. De ader wordt met echo opgezocht. De lijn wordt in een ader van de bovenarm tussen de binnenkant van de elleboog en de oksel geplaatst. Het uiteinde wordt opgeschoven tot in de grote holle ader in de borstkas. Het uiteinde ligt dan net boven het hart. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten. Direct hierna kan de PICC-lijn gebruikt worden.

Na de ingreep

Een klein gedeelte van de lijn is zichtbaar op uw arm. Dit wordt afgedekt met een beschermende pleister. De lijn wordt vastgezet en beveiligd door een zogenaamde 'statlock pleister'. Deze pleister heeft klemmetjes waarmee de PICC-lijn vast geklikt wordt.

Na elk gebruik dient de lijn te worden doorgespoten met een zoutwateroplossing. Ook als deze niet in gebruik is, dient dit wekelijks te gebeuren. Tevens wordt de pleister wekelijks vervangen. Dit kan gebeuren op de dagbehandeling of door de thuiszorg. De verpleegkundige kan u hierover meer informatie geven.

Geen opname nodig: dagbehandeling.

Vaak wordt de PICC-lijn ingebracht wanneer u tijdens een opname langdurig een infuus nodig heeft.

Komt u van huis dan wordt u in dagbehandeling geholpen.

Dagbehandeling betekent dat u 's morgens of 's middags naar het ziekenhuis komt. U wordt geholpen op de dag van opname en mag, als alles goed gaat, dezelfde dag weer naar huis. (Dit kan ook wat later op de avond zijn).

Op de afdeling dagbehandeling zijn een aantal zaken anders geregeld dan op de andere afdelingen van het ziekenhuis.

- De bezoekenregeling is in overleg met de verpleegkundige.
- Afhankelijk van uw behandeling worden maaltijden verstrekt.

Verwijderen van de PICC-lijn

De PICC-lijn kan tot twaalf maanden blijven zitten. Indien de PICC-lijn niet meer gebruikt hoeft te worden kan deze, na overleg met uw specialist, door de verpleegkundige worden verwijderd.

Belangrijk

U mag met de PICC-lijn gewoon douchen. Een bad nemen of zwemmen kan niet. Uit de arm waarin de PICC-lijn is ingebracht, mag geen bloed worden afgenomen. Ook mag aan die arm geen bloeddruk worden gemeten.

Complicaties

Neem direct contact op indien:

- Roodheid, zwelling, warmte, vocht en pijn rondom de

- insteekopening.
- Koorts, hoger dan 38,5 graden Celsius of koude rillingen.
- Zwelling van de arm of schouder.
- Pijn tijdens het inspuiten van de PICC-lijn.
- Loslaten van het afsluitdopje.
- Kortademigheid, hoesten en pijn ter hoogte van de borstkas.

Belangrijke telefoonnummers

Bij vragen of complicaties tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie via telefoonnummer (040) 888 85 50.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via telefoonnummer (040) 888 88 11.

Máxima Oncologisch Centrum

Indien u onder behandeling bent bij Máxima Oncologisch Centrum, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw casemanager via telefoonnummer (040) 888 53 20. Buiten kantooruren belt u naar de verpleegafdeling oncologie via telefoonnummer (040) 888 93 20.