

Adviezen voor thuis na het plaatsen van een PICC-lijn

- Als de behandeling onder narcose heeft plaatsgevonden, is het raadzaam op de dag van de behandeling licht verteerbaar te eten (kleine porties en geen vette producten). De volgende dag kunt u weer alles eten en drinken.
- Douchen mag, pleisters van de PICC-lijn mogen kort nat worden.
- Niet in bad of zwemmen.
- Niet naar de sauna.
- Niet zwaar tillen.
- Geen bloeddruk meten aan de kant waar de PICC-lijn is ingebracht.
- Bloedafname via PICC-lijn is mogelijk, echter niet via reguliere bloedafname maar via de oncologie verpleegkundige.
- De eerste 3 dagen na de operatie gebruikt u de medicatie die u vanuit het ziekenhuis heeft meegekregen. Daarna mag u bij pijnklachten 3 tot 4x daags 2 tabletten paracetamol à 500 mg innemen.

Neem contact op bij:

- Een temperatuur boven 38,5 °C.
- Roodheid en zwelling rondom de PICC lijn.
- Toenemende pijnklachten die niet verminderen na het innemen van pijnstillers.
- Lekkage van vocht of bloed.
- Kortademigheid, hoesten of pijn op de borst.

Heeft u vragen?

- **Op de dag van opname** kunt u tot 19.00 uur contact opnemen met de Dagbehandeling: 040 - 888 9280.
- **Tussen 19.00 en 08.30 uur** kunt u contact opnemen met de Spoed Eisende Hulp: 040 - 888 8811.
- **Na de dag van opname** kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de polikliniek: Chirurgie: 040 - 888 85 50.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.