

Naar huis met antibiotica via een infuus

Uw behandelend arts heeft samen met u besloten dat uw behandeling met antibiotica via een infuus (intraveneus) thuis voortgezet kan worden. Deze infuusbehandeling wordt gestart in het ziekenhuis. Daarna kan de behandeling veilig en goed worden voortgezet in uw eigen comfortabele thuisomgeving, zodat u uw dagelijkse activiteiten weer zo snel mogelijk kunt hervatten. Uw behandelend arts maakt goede afspraken over de thuisbehandeling met de thuiszorg en/of zorginstelling en/of uw huisarts.

Werkwijze

In het ziekenhuis krijgt u een infuuslijn in een bloedvat ingebracht. De keuze voor de infuuslijn hangt af van een aantal factoren, zoals kwaliteit van de bloedvaten, duur van de antibioticabehandeling en het type antibioticum. De arts bespreekt dit met u. De antibiotica worden via een infuuszak of cassette toegediend.

De infuuszak of cassette is met een slangetje aangesloten op een mobiele pomp. De pomp werkt op een accu die opgeladen moet worden in de nacht. Overdag bent u mobiel. De veiligheid van de zorg staat voorop, daarom staat u onder intensieve controle van de thuiszorg.

Een gespecialiseerde verpleegkundige van de thuiszorg bezoekt u dagelijks om de antibiotica aan te sluiten en om de insteekopening van de katheter te verzorgen. Soms is het nodig om uw bloed extra te laten controleren en/of op controle te komen op de poli van uw behandelend arts. De afspraken hiervoor krijgt u bij het ontslag van de afdelingsverpleegkundige.

Wie regelt mijn zorg thuis bij ontslag?

De verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen schakelt de transfer-verpleegkundige van Máxima MC in om uw ontslag te regelen. De transferverpleegkundige is gespecialiseerd in het regelen van zorg na de ziekenhuisopname. De transfer-verpleegkundige neemt telefonisch contact met u op om de zorg in de thuissituatie met u af te stemmen.

Medicijnen en pomp thuis

De transferverpleegkundige vertelt u wanneer en op welk tijdstip de medicijnen voor u klaarliggen bij apotheek De Run in Veldhoven. De pomp en de benodigde materialen worden meegebracht door de verpleegkundige van de thuiszorg bij het eerste bezoek.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Wanneer moet u contact opnemen?

Soms kunnen complicaties, bijwerkingen of problemen voorkomen. Dat kan altijd gebeuren, of u nu thuis of in het ziekenhuis bent. Aarzel niet om contact op te nemen met de thuiszorg als u zich zorgen maakt. De contactgegevens van de thuiszorg krijgt u bij het eerste bezoek van de thuiszorg. De thuiszorg staat in nauw contact met het ziekenhuis. De contactgegevens van het ziekenhuis staan vermeld aan het eind van deze folder.

Neem direct contact op met de gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg bij:

- Indien de infuuslijn uit het bloedvat gaat (druk zelf het bloedvat stevig af totdat het wondje niet meer bloedt);
- Indien de infuuslijn lekt;
- Trombose: herkenbaar aan pijn aan de arm of schouder, zwelling en roodheid, gespannen en/of blinkende huid;
- Kortademigheid, pijn bij het hoesten ter hoogte van de borstkas of bewustzijnsverlies
- Koorts (een temperatuur van 38°C of hoger);
- Een ontsteking rondom de insteekopening (u merkt dit aan roodheid, zwelling, pijn, warmte en/of vocht (pus));
- Als u pijn heeft tijdens het toedienen van de medicijnen;
- Huiduitslag: jeuk, warm, rood, zwellingen;
- Ernstige diarree en/of braken;
- Zwelling van het gezicht (bijvoorbeeld ogen of lippen);
- Zwelling van keel, metaalachtige smaak en/of jeuk in de mond.

Bij spoed belt u het Máxima MC, afdeling Eerste Hulp: (040) 888 811 (24 uur per dag bereikbaar).