

Postoperatief - eras beleid

	Eten	Infuus	CAD	Indien drain	Mobiliseren	Pijnstilling	Controles	Medicatie	Lab
OK dag	Helder vloeibaar tot vast	2,5L	In	In	Minimaal tot op de bedrand	PCM, oxy, evt. LIC/PCA/epiduraal	EWS, VB op indicatie	POMB	Afh. OK
	Kauwgom							Start Fragmin tenzij	
Dag 1	Algemeen	Afbouwen	Uit, tenzij LAR/epiduraal	< 50cc/24u uit	Maximaal naar kunnen	PCM, oxy, evt. LIC/PCA/epiduraal	EWS, VB op indicatie	Start Magnesium-hydroxide en Movicolon	CRP, L, Hb/Ht, KNUK
	Kauwgom	1L drinken						(start) Fragmin	
	En+/Ei+	Koffie							
Dag 2	Algemeen	Infuus naar venflon	Uit bij LAR/epiduraal	Uit, tenzij	Maximaal naar kunnen	PCM, oxy, evt. LIC/PCA/epiduraal	EWS, VB stop tenzij		
	Kauwgom	Koffie				Epiduraal uit i.o.m. APS			
	En+/Ei+								
Dag 3, 4 en 5	Algemeen					LIC uit bij ontslag, anders max 7 dagen in situ.	EWS		Dag 3 en 5 (tenzij vaker op indicatie); CRP, L, Hb/Ht, KNUK
	En+/Ei+								