

Nazorgadviezen na een BAHA operatie

U heeft een BAHA operatie gehad. In deze folder leest u de adviezen voor na de operatie.

- Als de behandeling onder narcose heeft plaatsgevonden, op de dag van de behandeling licht verteerbaar eten; de volgende dag kunt u weer gewoon eten en drinken.
- Het siliconen ringetje bij de wond moet 1 week droog blijven, dus géén haren wassen.
- De hechtingen worden verwijderd bij controle op de polikliniek.
- Na 2 maanden zit de schroef stevig in het bot verankerd en kan de BAHA aangebracht worden.
- Na 1 week kunt u uw normale werkzaamheden weer hervatten.
- De eerste 3 dagen na de operatie gebruikt u de medicatie die u vanuit het ziekenhuis heeft meegekregen. Daarna mag u bij pijnklachten 3 tot 4 x daags 2 tabletten paracetamol à 500 mg innemen.

.....

.....

Neem contact op

- Bij toenemende pijnklachten die niet verminderen na het innemen van pijnstillers;
- Bij een aanhoudende temperatuur boven 38,5 °C;
- Bij toenemende roodheid en zwelling rondom het schroefje.

Heeft u vragen:

- **Op de dag van opname** kunt u tot 19.00 uur contact opnemen met de Dagbehandeling: 040 - 888 9280.
- **Tussen 19.00 en 08.30 uur** kunt u contact opnemen met de Spoed Eisende Hulp: 040 - 888 8811.
- **Na de dag van opname** kunt u contact opnemen met de polikliniek: KNO: 040 - 888 56 70.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.