

Salbutamol

Intensief inhalatieschema

Salbutamol = airomir en ventolin

Dosering:

Salbutamol 100 microgram

Start Salbutamol

U start de toediening van Salbutamol omdat:

- uw kind ernstige benauwdheidsklachten heeft,
- de Salbutamol in tegenstelling tot normaal geen 3 uur werkt maar slechts 1 uur of korter.

Let op:

- Geef elke puf apart: dat wil zeggen: één pufje per keer in de voorzetkamer.
- Altijd geldt dat u ervan overtuigd moet zijn dat er op een correcte manier is geïnhaleerd.
- Een duidelijke afname van de klachten betekent dat uw kind bij de volgende toediening van de medicatie eigenlijk nog klachtenvrij is.

Toediening Salbutamol

Het is nodig de Salbutamol snel achter elkaar te geven en wel als volgt:

4 pufjes Salbutamol elke 20 minuten; dit doet u drie keer, dus:

- 4 pufjes Salbutamol (= minuut 0)
- 20 minuten later weer 4 pufjes Salbutamol (= minuut 20)
- 20 minuten later weer 4 pufjes Salbutamol (= minuut 40)

Als uw kind niet opknapt of zelfs meer klachten krijgt na deze toediening van 3 x 4 pufjes dient u contact op te nemen met de huisarts, kinderarts of longverpleegkundige.

Hoe tevreden bent u over uw specialist of ziekenhuis? Geef uw mening op [ZorgkaartNederland.nl](https://www.zorgkaartnederland.nl)

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Als de klachten verminderen

Als de klachten verminderen gaat u door met 4 pufjes Salbutamol elk uur (elke 60 minuten), dit doet u drie keer, dus:

- 4 pufjes Salbutamol (= minuut 0)
- 1 uur later weer 4 pufjes Salbutamol (= minuut 60)
- 1 uur later weer 4 pufjes Salbutamol (= minuut 120)

Verder afbouwen

4 pufjes Salbutamol elke 3 uur gedurende minimaal 24 uur (eventueel 48 uur).

Dit betekent dat u ook 's nachts door moet gaan met het geven van de Salbutamol elke 3 uur, uw kind krijgt dan dus 8 x daags pufjes.

Van 8 x daags naar 6 x daags 4 pufjes:

4 pufjes Salbutamol inhaleren à 4 uur gedurende 24 uur (zowel dag en nacht).

Na 24 uur van 6 x daags naar 4 x daags 2 pufjes:

Bij **duidelijke afname van klachten doorgaan met 2 pufjes Salbutamol** inhaleren per keer overdag op de volgende tijdstippen: 8.00-13.00-18.00-23.00 uur. Zo nodig 's nachts eenmalig 2 pufjes Salbutamol erbij geven.

Bij **duidelijke afname van klachten zo nodig 1 à 2 pufjes Salbutamol per dag**.

Waarschuwen huisarts/kinderarts

In eerste instantie neemt u contact op met de huisarts :

- Als er geen verbetering of zelfs een toename van de klachten is ondanks het geven van de Salbutamol;
- Als u 48 uur Salbutamol à 3 uur aan het geven bent en u van mening bent dat u nog niet kunt gaan afbouwen met de Salbutamol;
- Als de Salbutamol minder dan 1 uur werkt of gaat minder dan 1 uur werken;
- Als uw kind koorts krijgt (temperatuur van 39.0-39.5 graden), pijn bij het hoesten/ademhalen en u bemerkt geen of weinig werking van de Salbutamol.