

Orale glucosetolerantietest (OGTT) voor acromegalie

U krijgt een OGTT omdat u klachten heeft die kunnen passen bij een te hoge concentratie van groeihormoon. Tijdens deze test onderzoeken we hoe uw groeihormoonspiegel in het bloed verandert nadat u glucose heeft ingenomen.

Doel van de test

Groeihormoon wordt gemaakt in de hypofyse, een kleine klier aan de onderzijde van de hersenen. Normaal gesproken daalt de productie van groeihormoon na inname van glucose. Als de hypofyse te veel groeihormoon produceert, gebeurt dit niet, of te weinig. Dit wordt ook wel acromegalie genoemd. Bij deze test onderzoeken we of dit bij u het geval is.

Vorbereiding

Voor deze test moet u nuchter zijn.

Dag van de test

U wordt 's ochtends opgenomen op de dagbehandeling. De test duurt ongeveer 3 uur. Tijdens de test moet u op het bed blijven en mag u niets eten en drinken, met uitzondering van een glucosedrankje dat u van ons krijgt.

U krijgt een infuusnaaldje ingebracht. Een half uur na het inbrengen van het infuusnaaldje wordt de eerste keer bloed afgenomen. Direct daarna moet u een glucosedrankje opdrinken. Daarna wordt nog vier keer bloed afgenomen, steeds met een half uur pauze ertussen. Na de test mag u zelfstandig naar huis.

Bijwerkingen

U kunt wat misselijk worden van het glucosedrankje.
U kunt zich tijdens of na de test wat slap/duizelig voelen.

Uitslag

Het duurt 1 week voordat alle bloedsuitslagen bekend zijn. U ontvangt een afspraak om de uitslag te bespreken met uw arts.

Vragen

Voor vragen kunt u bellen op doordeweekse dagen met de polikliniek interne geneeskunde 040-8886300.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.