

Betablokkers

Bij migraine

Deze folder geeft u beknopte informatie over uw medicijn. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de bijsluiter en het advies van uw arts en apotheker.

Wat heeft u gekregen?

U heeft een betablokker voorgeschreven gekregen. Dit medicijn is bedoeld om:

- de ernst van de aanval te verminderen;
- het aantal aanvallen te verminderen.

Betablokkers worden ook gebruikt bij de behandeling van bloeddruk en bij sommige hartkwalen.

Afhankelijk van de frequentie en variatie van uw migraine-klachten, is het effect van de betablokkers pas na een bepaalde periode bekend. De arts bespreekt dit met u.

U mag dit medicijn niet gebruiken bij:

- een ernstige geleidingsstoornis van het hart (sick sinus syndroom, AV-blok)
- hartfalen (decompensatio cordis)
- trage hartslag (bradycardie)
- lage bloeddruk (hypotensie)
- ernstige astma/bronchospasmen
- verstoorde bloedcirculatie in de ledematen.

Gebruiksaanwijzingen

U neemt dit medicijn dagelijks in. Afhankelijk van de tabletvorm en dosering is dat eenmaal of tweemaal daags. Dit hoort u van uw arts en leest u op het recept c.q. medicijndoosje.

Met uw arts bespreekt u of en wanneer de dosering aangepast moet worden. Bij (hinderlijke) bijwerkingen, bespreekt u het ophogen eerst met uw arts. Bijwerkingen kunnen verminderen na 1-2 weken door gewenning. Het effect kan pas na minimaal 3 maanden goed worden beoordeeld.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen zijn: duizeligheid bij overeind komen (lage bloeddruk), vermoeidheid en kort van adem bij inspanning (door trage hartslag), koude –soms witte verkleuring– van

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

vingers, buikklachten/obstipatie. Soms slaapstoornissen of nachtmerries, gewichtstoename en depressie. Leest u voor het volledige overzicht uw bijsluiter.

Andere medicatie naast betablokkers

Het is van belang dat u bij uw arts en apotheker aangeeft welke andere medicatie u neemt en de bijsluiter goed leest. Let op met andere medicijnen voor hartritme, zoals calciumantagonisten (m.n. verapamil, diltiazem), amiodaron en digoxine. Alcohol en sommige medicijnen voor hooikoorts of psychische klachten verhogen de bloedspiegel van betablokkers. Betablokkers kunnen bijwerkingen van ergotamine versterken. Gebruikt u medicijnen voor suikerziekte (insuline of tabletten) dan wordt de dosering van de bètablokker mogelijk aangepast.

Gebruikt u rizatriptan meer dan 3 dagen per week in combinatie met de bètablokker propranolol (niet met andere bètablokkers), dan neemt u een lagere dosering van rizatriptan (5mg) in.

Autorijden

Treden bijwerkingen op, dan mag u niet autorijden. Zie ook:

<http://www.rijveiligmetmedicijnen.nl/>

Soorten en merken betablokkers bij migraine

- o metoprolol (tablet) - Selokeen®
- o propranolol (tablet, capsule, drank)

Vragen?

Neem dan contact op met de polikliniek neurologie, telefoonnummer (040) 888 84 10 e-mail, hoofdpijnverpleegkundige@mmc.nl.