

Angiografie: Embolisatie van de bloedvaten

Het afsluiten van bloedvaten

U heeft met uw medisch specialist afgesproken dat binnenkort een embolisatie van uw bloedvaten plaatsvindt. In deze folder informeren wij u over deze behandeling. Het kan zijn dat het in uw situatie anders is. Uw afspraak vindt plaats op locatie Veldhoven.

Wat is embolisatie van de bloedvaten?

Bij een embolisatie worden door een slangetje (katheter) coils (metalen draadjes), een metalen plug of een speciale vloeistof ingebracht in het bloedvat. Het bloedvat wordt op deze manier afgesloten, waardoor er geen bloed meer doorheen kan stromen.

Vooraf

- Uw medisch specialist heeft u verteld dat u voor deze behandeling wordt opgenomen en dat u een nacht moet blijven.
- Bent u bij eerder röntgenonderzoek overgevoelig gebleken voor contrastmiddel, geef dit direct door aan de afdeling radiologie, telefoonnummer (040) 888 90 00.
- Als u bloed verdunnende middelen en/of metformine (Glucophage) gebruikt, bespreek dit vooraf met uw medisch specialist. In overleg stopt u (tijdelijk) met het gebruik hiervan.
- Andere medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken.

Vorbereiding thuis

- Het ruim ontharen van beide liezen de dag vóór het onderzoek met een tondeuse (dus niet scheren). Is dit niet mogelijk dan onthaart een verpleegkundige u bij opname.
- De dag van het onderzoek mag als ontbijt u 2 beschuiten/toast/witbrood met halvarine en jam (géén ander beleg!) en een kopje thee.
- Als het onderzoek in de loop van de middag plaatsvindt, dan mag u een lichte lunch eten.

Opname

U meldt zich op de afdeling. Daar heeft u een gesprek met een verpleegkundige. Hier wordt de bloeddruk, temperatuur en polsslag gemeten en er wordt bij u een infuusnaald geprikt. U krijgt een operatiehemd aan. Voordat u naar de afdeling radiologie gaat, gaat u nog naar het toilet. Tijdens de behandeling is dit niet meer mogelijk.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Behandeling

U wordt in bed naar de afdeling radiologie gebracht. Op de afdeling radiologie neemt de laborant(e) en radioloog de behandeling met u door. U neemt plaats op de behandeltafel. De laborant(e) legt steriele doeken over u heen. U krijgt een plaatselijke verdoving door een prikje in uw lies, zodat u tijdens de behandeling geen pijn voelt. Daarna prikt de radioloog uw bloedvat in de lies aan en brengt via dit gaatje een slangetje (katheter) in. Zodra het slangetje op de juiste plaats ligt, spuit de radioloog de contrastvloeistof in. Zo zijn de bloedvaten zichtbaar op een beeldscherm. Het inspuiten van de contrastvloeistof geeft een kortdurend warm gevoel. Via het slangetje (katheter) brengt de radioloog de coils (metalen draadjes), metalen plug of speciale vloeistof op de juiste plaats in het bloedvat. Het bloedvat wordt op deze manier afgesloten, waardoor het bloed niet meer verder door het bloedvat kan stromen.

Na de behandeling gaat het slangetje eruit. Daarna maakt de radioloog het gaatje in de bloedvat dicht. Dit kan op drie manieren:

1. De radioloog drukt het bloedvat (slagader) met de hand af. Dit afdrukken duurt ongeveer 15 minuten. Het gaatje gaat dan vanzelf dicht. Daarna krijgt u een drukverband.
2. De radioloog plaatst een soort plugje, die het bloedvat van binnenuit dichtdrukt. U krijgt (meestal) geen drukverband.
3. De radioloog drukt het bloedvat (ader) met de hand af. Dit afdrukken duurt ongeveer 5 minuten. Het gaatje gaat dan vanzelf dicht. Daarna krijgt u hierop een pleister.



indruk van het onderzoek

Na het onderzoek

- U gaat met bed terug naar de verpleegafdeling.
- Op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig de punctieplaats, de bloeddruk en de polsslag.
- Bij een drukverband: 3 uur plat liggen ('platte bedrust'). U mag niet draaien of overeind komen. Na de bedrust wordt het drukverband verwijderd en mag u voorzichtig weer in beweging komen ('mobiliseren'). U mag op de gang lopen en naar het toilet gaan.
- Bij een plugje: heeft u 1 uur halfzittende bedrust. Hierna mag u voorzichtig weer in beweging komen ('mobiliseren'). U mag op de gang lopen en naar het toilet gaan.
- Bij een pleister: heeft u 2 uur halfzittende bedrust. Hierna mag u voorzichtig weer in beweging komen ('mobiliseren'). U mag op de gang lopen en naar het toilet gaan.
- Als u denkt dat er bloed uit het wondje komt of als de lies opzwelt, waarschuw dan onmiddellijk de verpleegkundige.
- Na het onderzoek mag u eten en drinken.
- Ontslag, dezelfde dag of de volgende ochtend. Dit is al met u besproken.

De duur van het onderzoek

De behandeling duurt één tot drie uur.

Adviezen voor thuis

- De eerste 24 uur na de behandeling mag u niet autorijden en moet u rustig aan doen.
- Tot een week na het onderzoek mag u uw lies niet zwaar belasten. Dit houdt in dat u niet mag sporten en zwaar tillen.
- Op de plaats van de punctie kan een bloeditstorting ontstaan. Deze zakt in de loop van de tijd uit.
- Neem contact op met het ziekenhuis als de lies pijnlijk wordt.

Uitslag van het onderzoek of de behandeling

Uw medisch specialist informeert u tijdens een vervolgspraak over de uitslag.

Risico's / complicaties

Meestal verlopen deze onderzoeken zonder problemen.

Zeer zelden kan er een allergische reactie optreden voor het contrastmiddel.

Straling

Om organen en bloedvaten zichtbaar te maken gebruiken we röntgenstraling. Straling kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. De hoeveelheid röntgenstraling die wij gebruiken is echter zo gering, dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Ook niet als u meerdere onderzoeken krijgt.

Het is wel belangrijk om te weten of u in verwachting bent.

Sommige onderzoeken kunnen namelijk schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

Waardevolle bezittingen

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar veel mensen in en uitlopen. We raden u daarom aan om grote geldbedragen, pasjes, kostbare sieraden en andere waardevolle bezittingen thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal.

Belangrijke telefoonnummers

- Heeft u vragen over het onderzoek of de behandeling zelf, dan kunt u bellen met de afdeling radiologie, op werkdagen telefoonnummer (040) 888 90 00.
- Bent u verhinderd bel dan zo snel mogelijk met de afdeling radiologie om een nieuwe afspraak te maken. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur, (040) 888 90 00.
- Het telefoonnummer van de verpleegafdeling krijgt u bij opname.
- Buiten kantooruren neemt u contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (040) 888 88 11.