

‘Roesje’ tijdens endoscopisch onderzoek

U krijgt binnenkort endoscopisch onderzoek op de functieafdeling. U heeft met uw arts afgesproken dat u hiervoor een lichte verdoving (roesje) krijgt. Door het roesje is het voor u gemakkelijker om het onderzoek te ondergaan. Het vermindert uw ongemak, angst en eventuele pijn en daardoor verloopt het onderzoek gemakkelijker. Als u een C-pap apparaat heeft, moet u dat meebrengen naar het onderzoek.

Vorbereiding op het onderzoek

Het is belangrijk dat u iemand regelt die u na het onderzoek naar huis brengt, anders kunnen we u het roesje voor uw eigen veiligheid niet geven (zie: ‘Naar huis’). U krijgt een infuus in uw arm. Hierdoor dienen we een slaapverwekkende vloeistof toe. Sommige mensen vallen hierna in slaap, anderen blijven wakker.

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek bewaken we uw hartslag, het zuurstofgehalte van uw bloed en eventueel uw bloeddruk. Door de verdoving gaat u minder diep ademen. De verpleegkundige vraagt u dan om een paar keer diep door te ademen. Als het nodig is, krijgt u extra zuurstof.

Na het onderzoek

Na het onderzoek brengen we u naar een uitslaapkamer. Hier blijft u tot u goed wakker bent. Voordat u naar huis gaat, verwijderen we het infuus.

‘Roesje’ tijdens endoscopisch onderzoek

U krijgt binnenkort endoscopisch onderzoek op de functieafdeling. U heeft met uw arts afgesproken dat u hiervoor een lichte verdoving (roesje) krijgt. Door het roesje is het voor u gemakkelijker om het onderzoek te ondergaan. Het vermindert uw ongemak, angst en eventuele pijn en daardoor verloopt het onderzoek gemakkelijker. Als u een C-pap apparaat heeft, moet u dat meebrengen naar het onderzoek.

Vorbereiding op het onderzoek

Het is belangrijk dat u iemand regelt die u na het onderzoek naar huis brengt, anders kunnen we u het roesje voor uw eigen veiligheid niet geven (zie: ‘Naar huis’). U krijgt een infuus in uw arm. Hierdoor dienen we een slaapverwekkende vloeistof toe. Sommige mensen vallen hierna in slaap, anderen blijven wakker.

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek bewaken we uw hartslag, het zuurstofgehalte van uw bloed en eventueel uw bloeddruk. Door de verdoving gaat u minder diep ademen. De verpleegkundige vraagt u dan om een paar keer diep door te ademen. Als het nodig is, krijgt u extra zuurstof.

Na het onderzoek

Na het onderzoek brengen we u naar een uitslaapkamer. Hier blijft u tot u goed wakker bent. Voordat u naar huis gaat, verwijderen we het infuus.

Bijwerkingen en mogelijke complicaties

Een bijwerking van de verdoving kan zijn dat u na het onderzoek nog enkele uren suf bent. Dit heet een late slaapreactie. Mogelijk vergeet u het onderzoek en de uitslag. In zeldzame gevallen ontstaan problemen met de ademhaling of de hartfunctie. Bij 1 op de 1000 patiënten kan het hartritme onregelmatig worden. Deze problemen zijn meestal goed te behandelen. Eventueel kunnen medicijnen worden gegeven om het effect van het slaapverwekkende middel ongedaan te maken.

Naar huis

Het is mogelijk dat u een late slaapreactie krijgt. Die is direct na het onderzoek nog niet aanwezig. Ook het geheugenverlies kunnen we direct na het onderzoek niet altijd beoordelen.

Voor uw eigen veiligheid staan wij daarom niet toe dat u alleen naar huis gaat met de auto, het openbaar vervoer of de taxi. Zorg ervoor dat iemand u ophaalt en naar huis brengt. Het is niet verstandig om op de dag van het onderzoek belangrijke beslissingen te nemen of belangrijke transacties te doen. Dit in verband met het mogelijke geheugenverlies. Zorg dat u géén gevaarlijke machines hoeft te bedienen en gebruik geen alcoholische dranken. Alcohol kan het versuffende effect van de verdoving versterken.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Bijwerkingen en mogelijke complicaties

Een bijwerking van de verdoving kan zijn dat u na het onderzoek nog enkele uren suf bent. Dit heet een late slaapreactie. Mogelijk vergeet u het onderzoek en de uitslag. In zeldzame gevallen ontstaan problemen met de ademhaling of de hartfunctie. Bij 1 op de 1000 patiënten kan het hartritme onregelmatig worden. Deze problemen zijn meestal goed te behandelen. Eventueel kunnen medicijnen worden gegeven om het effect van het slaapverwekkende middel ongedaan te maken.

Naar huis

Het is mogelijk dat u een late slaapreactie krijgt. Die is direct na het onderzoek nog niet aanwezig. Ook het geheugenverlies kunnen we direct na het onderzoek niet altijd beoordelen.

Voor uw eigen veiligheid staan wij daarom niet toe dat u alleen naar huis gaat met de auto, het openbaar vervoer of de taxi. Zorg ervoor dat iemand u ophaalt en naar huis brengt. Het is niet verstandig om op de dag van het onderzoek belangrijke beslissingen te nemen of belangrijke transacties te doen. Dit in verband met het mogelijke geheugenverlies. Zorg dat u géén gevaarlijke machines hoeft te bedienen en gebruik geen alcoholische dranken. Alcohol kan het versuffende effect van de verdoving versterken.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.