

Rechtskatheterisatie

(meten van de druk in hart en longslagader)

Rechtskatheterisatie is een onderzoek waarbij we met een katheter de druk meten in het hart en de longslagader. Tijdens het onderzoek wordt een katheter via een ader in de lies tot in het hart geschoven. Zo wordt er op verschillende plaatsen in het hart (hartboezems en hartkamers, longslagader (arteria pulmonalis) gemeten.

Wanneer een rechtskatheterisatie?

Een rechtskatheterisatie is nodig bij patiënten die bijvoorbeeld een aangeboren hartaandoening, hartklepafwijkingen of hartfalen hebben. Of wanneer er sprake is van een te hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen.

Een rechtskatheterisatie geeft de cardioloog informatie over de hartaandoening en hoe erg deze is. Ook geeft het weer, hoe het hart uitpompst en wat de bloeddruk is in verschillende bloedvaten.

Vorbereiding

U meldt zich op de afdeling waar u opgenomen wordt. Daar krijgt u een opname gesprek met de verpleegkundige. Vlak voor het onderzoek krijgt u een infuus ingebracht. Voor het onderzoek brengen we u naar de katheterisatiekamer, een soort operatiekamer. Daar gaat u op een onderzoeksbed liggen. Vóór het inbrengen van de katheter verdoven we de huid op de plek in de lies waar de katheter in een ader gaat. Het onderzoek zelf doet geen pijn. De prik van de verdoving kunt u wel voelen.

Via de ader in de lies wordt de katheter tot in het hart ingebracht en wordt op verschillende plekken in het hart de bloeddruk gemeten. Soms wordt er ook wat bloed afgenomen om de hoeveelheid zuurstof te meten. Met een röntgenapparaat wordt de plaats van de katheter en wat er gebeurt in de gaten gehouden. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek krijgt u een pleister en/of een drukverband in de lies. Deze blijft één uur zitten. Daarna gaat u terug naar de afdeling, waar u nog een korte periode bedrust houdt.

De uitslag

De cardioloog bekijkt de resultaten na het onderzoek goed. Soms is het nodig om de bloedsuikerspiegel (zuurstofgehalte) af te wachten. Daarom krijgt u de uitslagen op de eerstvolgende poli afspraak te horen. Vaak is dit binnen 1 tot 2 weken na het onderzoek.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Bijwerkingen en risico's

Mogelijke complicaties zijn:

- Bloeduitstortingen op de plek waar we u prikken.

Wanneer bellen?

Bel de huisarts als:

- Er pijn, roodheid of plotse zwelling in de lies ontstaat;
- De wond gaat bloeden.

Leefregels

Als u weer thuis bent, dient u met een aantal zaken rekening te houden:

- Op de dag van de behandeling mag u douchen.
- De dag na de behandeling mag u de pleister verwijderen. Schoonmaken van de huid mag met water en zeep.

Neem contact op bij vragen of onduidelijkheden

- Op de dag van opname kunt u tot 19.00 uur contact opnemen met de Dagbehandeling: (040) 888 9280.
- Tussen 19.00 en 08.30 uur kunt u contact opnemen met de SEH: (040) 888 8811
- Na de dag van opname kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de polikliniek Cardiologie: (040) 888 82 00