

Diagnostische laparoscopie

Binnenkort komt u naar het ziekenhuis voor een diagnostische laparoscopie (laparoscopische operatie). In deze folder kunt u lezen over de werking van de eierstokken, eileiders en de baarmoeder, hoe de operatie verloopt, waarom deze operatie nodig is en wat u kunt verwachten van het herstel na de operatie.

Baarmoeder, eileiders en eierstokken

Een normale baarmoeder heeft de vorm en grote van een peer. De wand van de baarmoeder bestaat uit spierweefsel, de binnenzijde is bekleed met slijmvlies. Het onderste deel mondt uit in de schede en wordt baarmoedermond of baarmoederhals genoemd. Aan de brede bovenkant monden twee eileiders in de baarmoeder uit. Deze dunne soepele buisjes beginnen bij de baarmoeder en eindigen bij de eierstokken. Baarmoeder, eileiders en eierstokken liggen niet los in de buik, maar zitten met bindweefselbanden vast onderin het bekken.

Functie van eierstokken, eileiders en baarmoeder

In één van de eierstokken rijpt elke maand een eikel. Daarnaast maken de eierstokken hormonen aan die zorgen voor de maandelijkse menstruatie. De eileiders hebben een transportfunctie. Zaadcellen komen via de vagina en de baarmoeder door de eileiders naar de eierstok. Als een eisprong heeft plaatsgevonden kunnen ze een eikel bevruchten. Een niet bevruchte eikel lost vanzelf op. Een bevruchte eikel wordt door de eileider naar de baarmoeder vervoerd. Hormonen die door de eierstokken gemaakt worden, bouwen elke maand het baarmoederslijmvlies op. Nestelt zich geen bevruchte eikel in de baarmoeder, dan stoot de baarmoeder het slijmvlies met bloedverlies af middels de menstruatie. De baarmoeder heeft de functie om te menstrueren en om zwangerschappen te dragen.

Reden voor een diagnostische laparoscopie

Een laparoscopie kan nodig zijn om bijvoorbeeld de oorzaak te vinden van buikpijn of om na te gaan hoe een bepaalde afwijking eruit ziet. Ook kan de ingreep worden uitgevoerd bij onderzoek naar onvruchtbaarheid.

Een cyste van de eierstok of een vergrote eierstok

Een cyste is een met vocht gevulde holte in de eierstok. Niet alle cysten hoeven geopereerd te worden. Elke cyclus rijpt in één van de eierstokken een eikel in een kleine holte gevuld met vocht. Deze met vocht gevulde ruimte noemt men een follikel of eiblaasje. De follikel groeit ongeveer tot een doorsnede van 2 à 3 centimeter voordat deze tijdens de eisprong

Hoe tevreden bent u over uw specialist of ziekenhuis? Geef uw mening op [ZorgkaartNederland.nl](https://www.zorgkaartnederland.nl)

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

barst. Soms groeit zo'n follikel door. We spreken dan van een persisterende (aanwezig blijvende) follikel. Deze verdwijnt meestal uit zichzelf binnen enkele maanden. Als een cyste niet verdwijnt kan een operatie noodzakelijk zijn.

Een ander soort cyste is een cystadenoom: een goedaardige afwijking waarbij zich slijm of ander vocht in de cyste ophoopt. Een ander voorbeeld is een endometriosecyste, hierbij bevindt zich baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder. Dit kan ook in de eierstok zijn waarbij zich bloed ophoopt in een soort cyste. Nog een ander soort cyste is een dermoïdcyste. Allerlei soorten weefsel zijn hierin aanwezig, zoals haren, botten en talg.

Het verwijderen van normale eierstokken

Bij sommige vormen van borstkanker adviseert de arts om normale eierstokken te verwijderen, bijvoorbeeld als de kanker gevoelig is voor vrouwelijke hormonen die de eierstokken maken. Ook bij vrouwen met verscheidene nabije familieleden met eierstokkanker en/of borstkanker, en bij wie genetische mutatie is vastgesteld, speelt soms de overweging om gezonde eierstokken te verwijderen om op deze manier kanker te voorkomen.

Sterilisatie

Door middel van een laparoscopie kan een vrouw gesteriliseerd worden.

Endometriose

Bij endometriose bevindt het slijmvlies, dat de binnenkant van de baarmoeder bekleedt, zich ook aan de buitenkant van de baarmoeder: in de buikholte of in de eierstokken. De menstruaties zijn vaak pijnlijk, omdat deze plekjes meebloeden tijdens en menstruatie. Endometriose kan ook verklevingen veroorzaken.

Myomen

Myomen (vleesbomen) zijn goedaardige verdikkingen in de wand van de baarmoeder. Meestal geven ze geen klachten, maar soms is er overmatig bloedverlies, buikpijn of verminderde vruchtbaarheid. Behandeling is alleen nodig in het geval van klachten.

Verwijdering van de baarmoeder

Voor uitgebreide informatie over het verwijderen van de baarmoeder verwijzen we u naar de folder 'het verwijderen van de baarmoeder bij goedaardige aandoeningen'.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap bevindt zich buiten de baarmoeder, meestal in de eileider. Soms is een laparoscopie noodzakelijk.

Hoe verloopt de operatie?

Laparoscopie betekent: in de buik (laparo) kijken (scopie). De operatie gebeurt altijd onder narcose. De gynaecoloog maakt een klein sneetje in de navel of in de onderrand van de navel en brengt door dat sneetje een kijkbuis (laparoscoop) in de buikholte. In de onderbuik wordt een tweede sneetje gemaakt om een hulpinstrument in te brengen waardoor de

moelijk bereikbare plaatsen ook zichtbaar kunnen worden gemaakt. De buik wordt gevuld met onschadelijk koolzuurgas. Zo ontstaat ruimte in de buik om verschillende organen te zien. De baarmoeder, eileiders en eierstokken worden zo zichtbaar op een monitor.

De operatie

Tijdens de operatie krijgt u een infuus in de arm om ervoor te zorgen dat u voldoende vocht binnen krijgt en om eventueel medicijnen toe te dienen. Dit infuus wordt meestal enkele uren na de operatie verwijderd. De ingreep kan enige pijn veroorzaken. Soms heeft u wat last van buikpijn, pijn in de schouder of spierpijn. Enkele dagen na de operatie kunt u weer normaal functioneren. De wondjes worden gehecht met materiaal dat oplost, hierdoor kan de navel soms wat vochtig worden. Die lijkt dan wat ontstoken; maar gaat vrijwel altijd vanzelf weer over.

Voor het ontslag uit het ziekenhuis wordt er een afspraak gemaakt voor nacontrole op de polikliniek.

Als u weer thuis bent

- Mag u douchen;
- Mag u na 7 dagen een bad nemen, als er geen bloedverlies meer is;
- Hechtingen lossen na verloop van tijd vanzelf op.
- Gemeenschap is geen probleem.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze aan de arts stellen tijdens uw bezoek aan de polikliniek. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek gynaecologie en na kantooruren met de verloskamer. Er zijn alleen op locatie Veldhoven verloskamers.

- Polikliniek gynaecologie (040) 888 83 80
- Verloskamer (040) 888 95 51