

Valproïnezuur

Medicatie om migraineaanvallen te verminderen

Deze informatiefolder geeft u slechts een beknopt informatieoverzicht over uw medicijn. Voor de volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluiter en het advies van uw arts en apotheker.

Wat heeft u gekregen?

U heeft valproïnezuur voorgeschreven gekregen. Dit is een medicijn dat bedoeld is om uw migraine in de toekomst te verminderen. Het doel is om de ernst en het aantal migraine aanvallen te verminderen. Valproïnezuur wordt ook gebruikt bij de behandeling van epilepsie en bij bipolaire stoornis (psychiatrische aandoening).

Afhankelijk van de frequentie en variatie van uw migraineklachten, kan pas na een bepaalde periode een uitspraak gedaan worden over het effect. De duur van deze periode bespreekt u met uw arts.

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

Bij ernstige lever- of alvleesklierziekten of bij sommige stofwisselingsziekten.

Gebruiksaanwijzingen

U neemt dit medicijn dagelijks in. Afhankelijk van de dosering is dat eenmaal of tweemaal daags. Dit hoort u van uw arts en leest u op het recept en/of medicijndoosje.

Met uw arts bespreekt u of, en wanneer, de dosering aangepast moet worden. Bij (hinderlijke) bijwerkingen, dient u het ophogen eerst met uw arts te bespreken.

Bijwerkingen kunnen verminderen na 1-2 weken door gewenning. Het effect kan pas na minimaal 3 maanden goed worden beoordeeld.

De maximale dosering voor migraine is 1500mg/dag.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Bijwerkingen

Een aantal van de mogelijke bijwerkingen die kunnen optreden zijn:

- trillen, maag-darmklachten
- bloedarmoede
- slaperigheid
- duizeligheid
- veranderd gedrag
- gewichtstoename
- haaruitval

Leest u voor het volledige overzicht uw bijsluiter.

Kunt u er andere medicatie naast gebruiken?

Het is van belang dat u bij uw arts en apotheker aangeeft welke andere medicatie u neemt en dat u de bijsluiter goed leest.

Pas op met de combinatie met andere medicijnen tegen epilepsie. De effecten van rustgevend en/of psychische medicatie en bloedverdunners kunnen versterkt worden bij gelijktijdig gebruik van valproïnezuur.

Zwangerschap

Tijdens zwangerschap dient het middel niet gebruikt te worden in verband met een verhoogde kans op aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kind. Het middel wordt ook afgeraden bij vruchtbare vrouwen die geen doeltreffende anticonceptie gebruiken. *De bijsluiter toont een volledig overzicht van risico's en mogelijke gevolgen.*

Autorijden

Eerste week niet autorijden.

Welke soorten en merken valproïnezuur zijn er geregistreerd voor migraine?

- valproïnezuur
- natriumvalproaat
- Depakine®
- Orfiril