

Synacthentest

Een ACTH-stimulatietest is een test waarbij wordt gekeken of de bijnier in staat is voldoende cortisol te produceren. De hypofyse geeft de stof ACTH af wat de bijnier aanzet tot het maken van cortisol. Bij de test wordt deze stimulatie nagebootst met een middel dat vergelijkbaar is met ACTH. Door vervolgens de cortisolconcentratie in het bloed te meten, kan duidelijkheid worden gegeven over de functie van de bijnier.

Vorbereiding

Medicijnen (tabletten, puffers, neussprays) die corticosteroïden bevatten, zoals hydrocortison en prednison, mogen vanaf een bepaalde tijd vóór de test niet meer gebruikt worden. Dit hoort u van uw behandelend arts. Pas ná de ACTH-stimulatietest mag u ze weer gaan gebruiken.

U hoort ook van uw arts of u uw overige medicatie op de ochtend van uw bezoek aan de dagbehandeling mag innemen of dat u hiermee dient te wachten tot na de test.

Hormonale anticonceptie (zoals oestrogeen bevattende orale anticonceptiepill of de Nuvaring) heeft ook invloed op de test. Overleg met uw arts of u hiermee moet stoppen vooraf aan deze test. Als u zwanger bent, kunt u deze test niet ondergaan.

U hoeft niet nuchter te zijn voor deze test.

Dag van de test

U mag zich melden op de dagbehandeling van Máxima MC (In Eindhoven op route 500 of Veldhoven op route 21) en duurt ongeveer anderhalf uur. Voor de bloedafnames krijgt u een infuus in uw arm. Uit dit infuus wordt op vaste tijden bloed afgenomen, voor en nadat het hormoon ACTH (Synacthen) ingespoten is. Tijdens de test zit u op een stoel of ligt u op een bed.

Bijwerkingen

U kunt een tijdelijke warmtesensatie voelen of kortdurend misselijk zijn na toediening van het hormoon ACTH.

Uitslag

Na de test ontvangt u een afspraak om de uitslag van de test te bespreken.

Vragen

Voor vragen kunt u bellen op doordeweekse dagen met de polikliniek interne geneeskunde (040) 888 63 00.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.