


Blokkade van de achterhoofdzenuw (GON-infiltratie)

U laat binnenkort een blokkade van de nervus occipitalis (achterhoofdszenuw) uitvoeren om uw pijnklachten te behandelen of te verminderen. Deze behandeling kan bij clusterhoofdpijn (en bij sommige varianten) de hoofdpijn verlichten.

De behandeling

Tijdens de behandeling zit u op een onderzoeksbank. De achterhoofdszenuwen liggen onder de huid op het bot van de schedel. De juiste plaats van de infiltratie wordt opgezocht.

Er wordt op de plaats van de zenuw (tussen rotsbeen en midden op het achterhoofd) een naaldje ingebracht. Deze gaat tot het bot of totdat er tintelingen worden waargenomen bij het achterhoofd. Vervolgens wordt de naald wat teruggetrokken en wordt er Depomedrol® ingespoten; een mengsel van een lokale pijnstiller en ontstekingsremmers (corticosteroïden).



Bijwerkingen

Na de injectie kan het een klein beetje nabloeden, dit is veelal beperkt. In theorie kan er een infectie ontstaan, maar het risico hierop is uitermate klein. Soms voelt het behandelde gebied op het achterhoofd verdoofd of tintelend nadien. Dit kan geen kwaad.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Effect en evaluatie

Het effect van de behandeling treedt na enkele dagen op en wordt op de polikliniek na 2 maanden geëvalueerd.

Indien u een goed effect ervaart van de GON-infiltratie, kan deze vaker worden ingepland, maar niet ongelimiteerd. Dit kunt u verder bespreken op de polikliniek met uw behandelend neuroloog.